

Федеральное агентство по рыболовству
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ» (ФГБНУ «ВНИРО»)
(Новосибирский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО»))

«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических
ресурсов в водных объектах Новосибирской области на 2027 г.
(с оценкой воздействия на окружающую среду)»

«Утверждаю»

Врио руководителя
Новосибирского филиала ФГБНУ
«ВНИРО» («ЗапСибНИРО»)




В. И. Щербаков

08.07.2026

Новосибирск 2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Зав. лабораторией ихтиологии,
канд. с.-х. наук


подпись

В. Ф. Зайцев
(введение, разделы: 1 - 3,
заключение)

Ведущий научный сотрудник,
канд. биол. наук


подпись


М. А. Дорогин
(введение, разделы: 1 - 3,
заклучение)

Руководитель группы
мониторинга ВБР Томской
области


подпись

А. В. Цапенков
(разделы: 2 - 3)

Рук. группы гидробиологии,
д-р биол. наук


подпись

Л. С. Визер
(раздел: 1)

Специалист


подпись

В. А. Шаталин
(разделы: 2-3)

РЕФЕРАТ

Материалы, обосновывающие ОДУ (далее – Материалы) – 49 страниц, 8 рисунков, 23 таблицы, 38 источников

РЕКА ОБЬ, ПЛОТИНА ГЭС, СТЕРЛЯДЬ, НЕЛЬМА, ЧИСЛЕННОСТЬ, ПРОМЫСЕЛ, ПРОГНОЗ, ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ (ОДУ), ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Стерлядь, *Acipenser ruthenus* – речная туводная рыба, постоянно обитает в крупных реках Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Нельма, *Stenodus leucichthys nelma* – речная полупроходная и туводная рыба, постоянно обитающая в крупных реках Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Разработка ОДУ стерляди и нельмы в р. Обь в границах Новосибирской области проводится Новосибирским филиалом ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО») для получения квоты вылова водных биоресурсов с целью их изучения, определения численности и возможностей использования данных видов для искусственного воспроизводства.

В Материалах приведены сведения о распространении, биологических характеристиках и уловах стерляди и нельмы в период 1960–2025 гг. в реке Обь Новосибирской области, на участках выше и ниже Новосибирского водохранилища.

В 2025 г. при проведении научно-исследовательских работ для разработки ОДУ на участке р. Обь выше Новосибирского водохранилища в Сузунском районе выловлено 96 кг (311 экз.) стерляди, на участке р. Обь в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС – 98 кг (307 экз.) стерляди и 97 кг (37 экз.) нельмы.

По результатам проведенных исследований в 2025 г. на участке р. Обь в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС биомасса стада стерляди составила 8,3 т, нельмы – 3,2 т. На участке р. Обь в Сузунском районе биомасса стада стерляди составила 2,1 т.

Прогноз ОДУ стерляди на 2027 г. по Новосибирской области составляет 0,23 т. Вылов данной величины будет осуществляться в научно-исследовательских целях (0,2 т) и в целях аквакультуры (искусственного воспроизводства) (0,03 т).

Прогноз ОДУ нельмы на 2027 г. по Новосибирской области составляет 0,21 т. Вылов данной величины будет осуществляться в научно-исследовательских целях (0,1 т) и в целях аквакультуры (искусственного воспроизводства) (0,11 т).

Проведена оценка воздействия научно-исследовательского лова на окружающую среду.

Разработчик биологического обоснования – Новосибирский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО»).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Биомасса (B) – масса стада или какой-либо определенной его части.

Биомасса общая (B) – суммарная масса рыб в водоеме.

Вид промысловый – потенциальный или фактический объект промысла.

Возраст рыб (t) – число полных лет жизни. Обозначается арабской цифрой. Возраст сеголетка обозначается – 0+.

Динамика численности популяции – изменение численности популяции под влиянием действующих на нее факторов; закономерности динамики численности служат основой долгосрочного прогнозирования уловов.

Длина рыб средняя (L) – показатель, характеризующий линейный размер рыб в возрастной группе, улове или водоеме. Определяется как средневзвешенная величина с учетом объема выборки. Обычно измеряется длина тела от конца рыла до заднего края чешуйного покрова (промысловая длина) или до основания средних лучей хвостового плавника (длина по Смиту).

Запас – часть популяции рыб, которая рассматривается с позиции существующей или возможной эксплуатации.

Запас промысловый – часть запаса (в единицах массы или в штучном выражении), состоящая из рыб, размеры которых обычно считаются промысловыми или устанавливаются правилами рыболовства.

Использование устойчивое водных биологических ресурсов – использование водных биологических ресурсов, которое не приводит в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия водных биологических объектов и при котором сохраняется способность водных биологических объектов к воспроизводству и устойчивому существованию.

Лов контрольный – добыча (вылов) водных биоресурсов в целях проведения государственного мониторинга.

Масса рыб средняя (W) – показатель, характеризующий массу рыб в возрастной группе или улове.

Общий допустимый улов (ОДУ) – смотри улов общий допустимый (ОДУ).

Поклоение – особи одного года рождения.

Правила рыболовства – нормативный акт, устанавливающий условия, способы и порядок изъятия водных биоресурсов из определенных водных объектов рыбохозяйственного значения, перечисленных в специальной части данного нормативного акта, в целях обеспечения их устойчивого использования.

Прилов – случайное изъятие при специализированном промысле. Случайное изъятие означает вылов, изъятие или добычу вида или запаса рыб при ведении специализированного промысла другого вида или запаса рыб.

Прогноз улова – научно обоснованная величина изъятия рыб из водоема всеми видами промысла, рассчитанная с определенной заблаговременностью.

Производительность промысла – улов на единицу усилия.

Промысел (добыча) водных биологических ресурсов – комплексный процесс, включающий поиск и вылов (добычу) водных биологических ресурсов, сдачу улова на береговые рыбоприемные пункты.

Промысел специализированный – промысел, направленный на конкретный вид или запас рыб. Промысел считается специализированным, если какой-либо из видов ВБР составляет более 50 % веса общего улова.

Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов – документ, удостоверяющий право его владельца на изъятие определенного объема водных биоресурсов конкретных видов из водных объектов рыбохозяйственного значения.

Ресурсы водные биологические (ВБР) – организмы любых таксономических категорий, которые используются или могут использоваться человеком вне зависимости от целей и способов эксплуатации.

Сеть – сетное полотно, используемое для постройки обьецаивающих орудий лова.

Смертность общая – процесс сокращения численности рыб под влиянием промысла. Количественно характеризуется годовым (ϕZ) или мгновенным (Z) коэффициентами общей смертности.

Смертность естественная – процесс сокращения численности рыб под влиянием естественных причин (старение, болезни, хищники и прочее). Количественно характеризуется годовым (ϕM) или мгновенным (M) коэффициентами смертности.

Улов – совокупность пойманных рыб или других объектов промысла в штучном или весовом выражении.

Улов на единицу усилия (C/f или U/f) – улов в штучном выражении или в единицах массы, приходящийся на единицу промыслового усилия.

Улов общий допустимый (ОДУ) – прогнозная величина годового промыслового изъятия из единицы запаса, рассчитанная с учетом биологических особенностей данного запаса (продуктивности, динамики численности и др.) и целей его эксплуатации: соответствует оптимальной с точки зрения выбранного критерия регулирования, интенсивности промысла.

Улов промысловый (C или Y) – величина изъятия рыб из водоема всеми видами промысла.

Уловистость орудий лова – относительная вероятность выемки рыбы данного размерного класса.

Численность (N) – величина популяции (запаса) или определенной ее части, выраженная в штуках.

Численность рыб абсолютная (N) – суммарная численность рыб в водоеме, определенная тем или иным методом.

Численность рыб относительная (N') – численность рыб, выраженная в условных или косвенных показателях (улов на единицу площади, на промусилие, индексы урожайности или другие единицы).

Шаг ячеи – расстояние между двумя соседними узлами (соединениями нитей, при безузловом изготовлении) сетного полотна. Определяется только в мокрых орудиях лова путем измерения расстояния между 11 последовательными узлами сетного полотна и деления полученного числа на 10. Замеры должны быть произведены не менее чем на трех участках сетного полотна каждой детали орудия лова.

Ячея – многократно повторяющийся элемент сетного полотна, в виде многоугольника, образованный нитями.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 Общая характеристика среды обитания стерляди и нельмы	8
2 Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>) р. Обь в Сузунском районе и в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС	14
3 Нельма (<i>Stenodus leucichthys</i>) р. Обь в Сузунском районе и в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС	35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	47

ВВЕДЕНИЕ

Оценка состояния запасов стерляди и нельмы в р. Обь в пределах Новосибирской области Новосибирским филиалом ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» до 2021 г. не проводилась. Исключением является период 2012–2016 гг., когда осуществлялась оценка запасов стерляди и определялся ОДУ для научно-исследовательских целей в р. Обь выше Новосибирского водохранилища в границах Сузунского района.

Прогноз общих допустимых уловов (ОДУ) стерляди и нельмы в р. Обь в пределах Новосибирской области на 2027 г. подготовлен на основе материалов исследований при проведении вылова стерляди и нельмы в научных целях в 2021–2025 гг., прилове этих видов в контрольные орудия лова в 2017–2020 гг. и архивных данных. В работе также использовались материалы МВД России и Верхнеобского территориального управления Росрыболовства, полученные в ходе пресечения незаконного вылова и оборота ценных видов рыб.

Цель настоящего исследования – разработка прогноза общих допустимых уловов (ОДУ) стерляди и нельмы в р. Обь в пределах Новосибирской области на 2027 г.

Прогноз ОДУ стерляди и нельмы на 2027 г. основан на концепции предосторожного подхода [Бабаян, 2000] при вылове стерляди и нельмы в р. Обь в пределах Новосибирской области, ОДУ которых рассматривается как основной управляющий параметр при регулировании рыболовства. Прогнозная величина ОДУ стерляди и нельмы в 2027 г. включает научный вылов и вылов в целях аквакультуры (искусственного воспроизводства).

Основанием для проведения научно-исследовательских работ являются:

- План ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, на 2025 год, утвержденный приказом Росрыболовства от 10.09.2024 №503;

- Программа ФГБНУ «ВНИРО» выполнения работ при осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации на 2025 год.

- Заявка Новосибирского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на получение квот добычи (вылова) для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в 2025 г.;

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов водных биологических ресурсов» [Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08 сентября 2021 г. № 618];

- Приказ Федерального агентства по рыболовству «О представлении материалов, обосновывающих общие допустимые уловы водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Российской Федерации, а также в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, а также внесения в них изменений» [Приказ Федерального агентства по рыболовству от 06 февраля 2015 г. № 104].

1 Общая характеристика среды обитания стерляди и нельмы

В границах Новосибирской области расположены два участка р. Обь: выше Новосибирского водохранилища на территории Сузунского района (протяженность участка 75 км); и участок в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС (от плотины Новосибирской ГЭС до границ с Томской областью) (протяженность участка 144 км) (рисунок 1).




Рисунок 1 – Схема реки Оби на территории Новосибирской области

Общая характеристика ихтиофауны. Видовой состав водных биоресурсов в р. Обь в пределах Новосибирской области включает свыше 20 видов рыб и рыбообразных, относящихся к различным биологическим группам. Это полупроходные виды – осетр (*Asipenser baerii*), нельма (*Stenodus leucichthys nelma*), муксун (*Coregonus muksun*), пелядь (*Coregonus peled*) и туводные виды – стерлядь (*Asipenser ruthenus*), язь (*Leuciscus idus*), плотва (*Rutilus rutilus*), елец (*Leuciscus leuciscus*), лещ (*Abramis brama*), судак (*Sander lucioperca*), окунь пресноводный (*Perca fluviatilis*), ерш пресноводный (*Gymnocephalus cernuus*), щука (вид рода *Esox*), налим (*Lota lota*), караси: золотой и серебряный (виды рода *Carassius*), реже – линь (*Tinca tinca*), сазан (вид рода *Cyprinus*), таймень (*Hucho taimen*) [Журавлев, 2006; Попов, 2007]. Осетр и таймень занесены в Красную книгу России [Красная книга..., 2021], стерлядь, нельма, муксун – в Красную книгу Новосибирской области [Красная книга..., 2018].

Из непромысловых видов обитают минога (*Lethenteron kessleri*), пескарь (*Gobio gobio synocephalus*), подкаменщик (р. *Cottus*), верховка (*Leucaspius delineates*) и уклейка (*Alburnus alburnus*) [Журавлев, 2006; Попов, 2007].

Промысловая ихтиофауна представлена преимущественно акклиматизантами – лещом и судаком, на аборигенных рыб (щуку, язя, плотву, карася, окуня пресноводного и налима) приходится менее 24 % общего вылова.

Запретные для добычи (вылова) районы, сроки и виды водных биоресурсов:

Согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна [Приказ Минсельхоза России от 30.10.2020 № 646] (далее Правила), к запретным для добычи (вылова) водных биоресурсов районам (местам) относятся:

– зимовальные ямы, указанные в приложении № 1 к Правилам рыболовства «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна». Добыча (вылов) водных биоресурсов на зимовальных ямах запрещается с 15 ноября по 20 апреля;

– участок реки Обь с поймой от плотины Новосибирской ГЭС вниз до устья подходного канала.

Добыча (вылов всех видов водных биоресурсов запрещается:

– с 20 апреля по 20 мая – в реке Обь со всеми притоками, сорами, протоками и пойменными озерами, а также в притоках реки Иртыш;

– с 20 мая по 15 июня в реке Обь от устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни М. Кривошеково (685–691 км от устья по лоцманской карте);

– с 20 мая по 15 июня – в реке Обь в районе населенного пункта Почта (760–770 км от устья по лоцманской карте);

– с 20 мая по 15 июня – в реке Обь в районе населенного пункта Белоярка (777–788 км от устья по лоцманской карте);

– с 20 мая по 15 июня – в реке Обь в районе населенного пункта Ташара (800–806 км от устья по лоцманской карте);

– с 20 мая по 15 июня – в реке Обь в районе населенного пункта Вятский Камешек (816–820 км от устья по лоцманской карте);

К запретным для добычи (вылова) видам водных биоресурсов относятся: осетр сибирский, стерлядь, таймень, ленок, хариус, нельма, муксун.

По составу ихтиофауны и общему рыбохозяйственному значению, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения» оба участка р. Обь в пределах Новосибирской области относятся к рыбохозяйственным водным объектам высшей категории [Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 г. № 206].

Гидрологическая характеристика

Река Обь в Сузунском районе. Долина реки широкая, с хорошо развитой ассиметричной поймой: правобережная – шириной около 1,4 км, левобережная – в среднем 15 км. Пойма заболочена, расчленена многочисленными протоками, старицами, рукавами, покрыта озерами.

Гидрологический режим р. Обь на этом участке отражает характер таяния снегов в различных природных зонах. По уровням в р. Обь достаточно отчетливо выделяются две волны паводка: первая – весенняя, обусловленная таянием снега в равнинной и предгорной частях бассейна, с подъемом во второй половине апреля – начале мая, и вторая, связанная с таянием горных снегов и ледников, с максимумом в середине июня или в июле. Продолжительность половодья – 120–150 дней. Максимальный подъем уровня воды – 8,2 м. За период весеннего половодья по Оби на этом участке проходит до 40 км³ воды (77 % годового стока) [Савкин, Двуреченская, 2002].

Гидрологический режим в 2025 г. в целом был удовлетворительным для обитания стерляди на речном участке выше Новосибирского водохранилища. В течение мая средние декадные отметки уровня воды составляли 328–534 см, что превысило среднемноголетний уровень и обеспечило затопление нагульных биотопов (рисунок 2). Большой объем приточных вод в августе – октябре обеспечил продолжительный нагул рыб и молоди на пойме.




Рисунок 2 – Уровень воды р. Обь в Сузунском районе Новосибирской области

Наблюдение за загрязнением поверхностных вод на территории Новосибирской области проводит филиал «ВерхнеОбьрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз». Информация о результатах наблюдений публикуется в ежегодных Государственных докладах о состоянии и охране окружающей среды Новосибирской области.

В начале 2000-х гг. воды р. Обь на участке от г. Барнаула до г. Камень-на-Оби относились к чистым [Митрофанова, 2012]. В настоящее время класс качества воды – «загрязненная». К основным загрязняющим веществам относятся нефтепродукты, соединения азота, соединения меди, марганца, алюминия и железа общего [Государственный доклад ..., 2025].

Река Обь в нижнем бьефе НГЭС. Ниже плотины Новосибирской ГЭС Обь представляет собой типичную равнинную разветвленную реку с невысокими скоростями течения и преимущественно песчаными, реже илистыми и глинистыми грунтами. Лишь на отдельных участках встречается гравий, камни и выходы скальных пород.

Наибольший подъем уровня воды на рассматриваемом участке приходится на конец мая – начало июля, в период половодья. В большинстве случаев наблюдаются две волны половодья: первая – в апреле – мае, вторая – в июне – июле. Подъем уровня воды составляет от 1,8 до 6,1 м. Межень обычно наступает в сентябре – октябре. Гидрологический режим находится в большой зависимости от работы Новосибирской ГЭС [Савкин, Двуреченская, 2002].

В нижнем бьефе НГЭС, на участке Оби в границах Новосибирской области, среднедекадные значения уровня воды в период с середины апреля по конец августа 2025 г. были ниже среднемноголетних показателей (2017–2024 гг.) и составляли 65–273 см

(рисунок 3). Последующее повышение уровня в сентябре – октябре продлило период нагула стерляди на данном участке Оби.

Прогрев воды до нерестовых температур (13–16 °С) произошел в конце мая – начале июня.




Рисунок 3 – Уровень воды в р. Обь в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС

Класс качества воды р. Обь ниже плотины Новосибирской ГЭС варьирует от «очень загрязненная» до «грязная» (таблица 1) [Государственный доклад ..., 2025].

Таблица 1 – Качество поверхностных вод р. Обь на территории Новосибирской области в 2024 году (по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»)

Местоположение створа	Класс качества		Характерные загрязняющие вещества
300 м ниже ГЭС	4А	грязная	марганец, алюминий, медь, железо общее
3 км ниже города, середина	3Б	очень загрязненная	нефтепродукты, марганец, алюминий, азот нитритный
3 км ниже города, левый берег	4А	грязная	марганец, алюминий, железо общее, медь, азот нитритный
9 км ниже города	4А	грязная	алюминий, медь, железо общее
с. Дубровино	3Б	очень загрязненная	медь, марганец, железо общее

Содержание растворенного в воде кислорода в зимний период в зимний период 2019–2025 гг. находилось в пределах 10,5–11,6 мг/дм³, и было благоприятно для жизнедеятельности гидробионтов. На всем протяжении реки в донной фауне были обычны оксифильные виды, требовательные к качеству воды (ракообразные, ручейники и поденки).

Загрязнение воды приводит к накоплению вредных веществ в тканях рыб. Наиболее опасны тяжелые металлы (ртуть, кадмий и свинец), а также канцерогенные пестициды и инсектициды. Увеличение токсичных элементов в тканях рыб может повлиять на качество гамет производителей осетровых, сиговых и других видов рыб в бассейне р. Обь.

Согласно исследованиям испытательного центра рыбы, рыбопродуктов и продуктов моря (Тюменский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «Госрыбцентр», г. Тюмень), в тканях стерляди, выловленной в р. Обь в нижнем бьефе ГЭС в границах Новосибирской

области в 2025 г., содержание токсичных элементов не превышало ПДК (таблица 2). Общее состояние среды обитания не оказывало угнетающего влияния на рыб и развитие гидробионтов.

Таблица 2 – Информация о состоянии водных биологических ресурсов по химическим показателям, р. Обь, нижний бьеф ГЭС, 2025 г.

№ зоны	Район вылова (добычи)	Вид водных биологических ресурсов	Токсичные элементы, мг/кг				Пестициды, мг/кг*	
			Pb	Cd	Hg	As	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	ДДТ и его метаболиты
406	р. Обь, нижний бьеф ГЭС, Новосибирская область	стерлядь	0,081± 0,026	0,033± 0,011	0,064± 0,018	0,022± 0,009	Менее 0,002	0,187± 0,021
Допустимые уровни, мг/кг			1,0	0,2	0,3	1,0	0,03	0,3

Примечание: * – данные за 2024 г.

Кормовая база

Отбор гидробиологических проб (зоопланктона и зообентоса) на участке Оби в Сузунском районе проводился в июле и сентябре, на участке Оби в нижнем бьефе НГЭС (в черте г. Новосибирска) – в июне, июле и октябре. Всего в 2025 г. собрано 26 проб зоопланктона и 24 пробы зообентоса.

Сбор проб зоопланктона проводился путем процеживания 50 л воды через сеть Апштейна. Отбор бентосных проб в р. Обь производился при помощи дночерпателя Петерсена с площадью захвата 160 см². Классическим методом исследования видовой принадлежности зоопланктона и зообентоса является изучение внешней морфологии под световым или электронным микроскопом [Определитель зоопланктона..., 2010; Панкратова, 1983]. Пересчет численности и биомассы зоопланктона производился на 1 м³ [Методические рекомендации..., 1984], бентоса на 1 м² [Методическое пособие..., 1982].

Река Обь в Сузунском районе. В зоопланктоне русловых участков р. Обь в вегетационный период 2021–2024 гг. в видовом составе зоопланктона наблюдалось до 29 видов. Средняя сезонная численность зоопланктонного сообщества составляла от 0,91 до 23,22 тыс. экз./м³, биомасса – от 0,02 до 0,32 г/м³.

В 2025 г. отмечено 22 вида из трех систематических групп, 13 из которых относились к коловраткам (Rotifera), 6 – к ветвистоусым ракообразным (Cladocera), 3 – к веслоногим ракам (Copepoda). В летнем зоопланктоне наблюдалось 19 видов, осенью – 9. Средняя численность зоопланктонного сообщества составила 14,10 тыс. экз./м³, средняя биомасса – 0,07 г/м³. Доминировали коловратки: в численности их доля достигала 95 %, в биомассе – 69 %. Основная роль принадлежала *Keratella quadrata* Müller и *Brachionus calyciflorus* Pallas.

В составе зообентосного сообщества русловых участков р. Обь в 2021–2024 гг. насчитывалось от 3 до 23 видов. Средняя сезонная численность составляла от 161 до 544 экз./м², средняя биомасса – от 0,10 до 0,44 г/м².

В зообентосном сообществе р. Обь в летне-осенний период 2025 г. было обнаружено 23 вида из трех систематических групп: малощетинковых червей, личинок хирономид и ручейников. Численность летнего зообентоса составила 371 экз./м², биомасса – 0,27 г/м². Осенью численность зообентоса увеличилась до 409 экз./м², биомасса снизилась до 0,14 г/м². Средняя сезонная численность и биомасса зообентоса составила соответственно 390 экз./м² и 0,21 г/м². Основную роль в донной фауне этого участка реки играли личинки хирономид.

Река Обь в нижнем бьефе НГЭС. В зоопланктоне р. Обь в 2012–2024 гг. ежегодно встречалось от 11 до 33 видов. Биомасса планктонных организмов изменялась от 0,02 до 0,47 г/м³.

В 2025 г. в зоопланктоне было отмечено 26 видов из трех систематических групп, большая часть из которых (11 видов) относилась к коловраткам. Средняя численность зоопланктонного сообщества составила 7,35 тыс. экз./м³. В формировании биомассы зоопланктона в начале и середине лета основная роль принадлежала веслоногим ракообразным, осенью – ветвистоусым ракообразным. Средняя биомасса зоопланктона за летне-осенний период составила 0,37 г/м³.

Для участка р. Оби ниже плотины НГЭС характерны большие колебания количественных показателей донной фауны, что связано с мозаичностью биотопов и вторичноводностью большинства организмов, покидающих водоем на стадии имаго.

По данным гидробиологических съемок в период в 2016–2024 гг. видовой состав зообентоса достигал 37 видов, средняя численность составляла от 230 до 378 экз./м² средняя биомасса изменялась от 0,64 до 532,39 г/м². Более 98 % общей биомассы приходилось на некормовой бентос – моллюска *Viviparus viviparus* (L.).

В 2025 г. средняя сезонная численность и биомасса зообентоса составила соответственно 382 экз./м² и 256,09 г/м². Основу численности (69 %) создавал кормовой бентос при доминировании личинок хирономид и акклиматизантов – байкальских амфипод *Gmelinoides fasciatus* Sntbbing. Более 99 % общей биомассы приходилось на моллюска *Viviparus viviparus* (L.). Значимость приплотинного участка для нагула рыб повысилась к концу вегетационного периода, но осталась очень низкой, что связано с массовым развитием чужеродного моллюска, который является трофическим и биотопическим конкурентом для аборигенных моллюсков и личинок насекомых на прибрежных и пойменных участках.

2 Стерлядь (*Acipenser ruthenus*) р. Обь в Сузунском районе и в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС

Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн, Новосибирская область, код статистического промыслового района – 406, 489.

Разработчики биологического обоснования: Зайцев В.Ф., Балацкий П.С., Дорогин М.А., Шенхоров Р.Э. и другие.

Новосибирский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО»).

2.1 Материал и методика

2.1.1 Анализ доступного информационного обеспечения

Организованный промысел стерляди в р. Обь Новосибирской области не проводится с 1971 г. В период 1972–2005 гг. в отдельные годы проводился учет прилова стерляди при осуществлении промышленного рыболовства на приплотинном участке Новосибирской ГЭС, а с 2006 г. на контрольно-наблюдательном пункте (КНП) филиала, расположенном на приплотинном участке НГЭС.

В верхнем участке на р. Обь в границах Сузунского района с 2007 г. также проводится учет прилова стерляди в разрешенные орудия лова, а в 2012–2016 гг. осуществлялся сбор ихтиологического материала (учетные съемки) [Сечин, 2010] для оценки состояния запасов этого вида.

По распоряжению ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» с 2019 г. были возобновлены научные исследования в части проведения государственного мониторинга и ихтиологических наблюдений за численностью, распределением и условиями обитания стерляди в р. Обь Новосибирской области. Проведенные исследования позволили подготовить материалы, обосновывающие объем общего допустимого улова (ОДУ) стерляди р. Обь в 2021 г. в научно-исследовательских целях. В результате чего, с 2021 г. были начаты научно-исследовательские работы по изучению состояния запасов стерляди р. Обь в Новосибирской области.

Оценка численности стерляди проводилась для каждого участка реки, так как их разделяет Новосибирское водохранилище, протяженностью около 200 км, что привело к разделению верхнеобской популяции стерляди.

Для оценки запасов стерляди применяли метод прямого учета с использованием донных плавных сетей. Применение прямого учета позволяет определить численность и размерный состав стад рыб. На основании полученных материалов рассчитывается средневзвешенная величина плотности скоплений рыб (экз./га) по каждому участку реки согласно принятым методикам [Бабаян и др., 1984; Сечин, 2010].

Река Обь в Сузунском районе. Материалом для оценки и прогноза состояния запаса, определения ОДУ стерляди р. Обь на 2027 г. на данном участке Оби послужили материалы, полученные в ходе изучения состояния стада стерляди в 2025 г., использованы материалы периодов наблюдений 2012–2016 гг. и 2021–2024 гг., данные о прилове стерляди в контрольные орудия лова в 2019–2020 гг., а также литературные и архивные данные (таблица 3).

В апреле – мае 2012–2016 гг. на речном участке Сузунского района наблюдения за численностью и особенностями биологии стерляди, скатывающейся с мест зимовки на

нагул в Новосибирское водохранилище, проводились в период разовых выездов. Ввиду отсутствия круглогодичных наблюдений они не обладают полнотой информации и носят приблизительный характер [Материалы, обосновывающие..., 2017].

Таблица 3 – Объем собранного материала для оценки состояния запасов стерляди в р. Обь в границах Сузунского района

Год	Объем выборки, экз.	Сетепостановки, шт.	Плавь, шт.	Массовые промеры, экз.	Определен возраст, экз.
2012	19	15	20	19	-
2013	153	53	16	153	153
2014	128	109	14	128	128
2015	178	60	20	178	178
2016	62	40	32	62	62
2019	8	29	26	8	–
2020	449	48	16	107	–
2021	257	20	19	132	132
2022	281	23	20	247	166
2023	334	17	29	210	141
2024	281	17	19	107	94
2025	311	16	19	125	120

В 2021–2025 гг. контрольные ловы проводились в период с мая по декабрь. В период открытой воды лов осуществлялся с помощью плавных сетей ячеей 30–50 мм и длиной 75 м. Контрольные плавь проводились в русле р. Обь. Длина тоней колебалась от 50 до 1000 м. Глубина тоней в Оби изменялась от 3 до 7 м. Ставные сети ячеей 35–50 мм выставлялись в р. Оби в период ледостава. Проверка ставных сетей производилась один раз в 1–2 суток.

В 2025 г. на Сузунском участке р. Обь проведено 19 сетных плавов, учтены уловы из 16 сетепостановок. В уловах отмечали особей стерляди в возрасте от 1+ до 9+ лет. Длина рыб варьировалась от 16 до 48 см, масса – от 24 до 816 г. Было отловлено 311 экз. стерляди (96 кг).

Река Обь в нижнем бьефе НГЭС. Материалом для оценки и прогноза состояния запаса, определения ОДУ стерляди на участке Оби ниже плотины НГЭС в Новосибирской области послужили материалы, полученные в ходе изучения состояния стада стерляди в 2025 г. Также использованы материалы наблюдений 2021–2024 гг., данные о прилове стерляди в ставные сети в 2006–2019 гг., литературные данные и архивные материалы наблюдений.

В 2021–2025 гг. контрольные сетные ловы проводились в период открытой воды с мая по октябрь. Лов осуществлялся плавными сетями ячеей 30–50 мм и длиной 75 м. Длина тоней составляла 500–1300 м. Глубина тоней в Оби изменялась от 3 до 5 м.

В 2025 г. проведено 12 сетных плавов и 27 сетепостановок. В уловах отмечали особей стерляди в возрасте от 1+ до 9+ лет. Длина рыб варьировалась от 22 до 47 см, масса – от 70 до 1100 г. Было отловлено 307 экз. стерляди (98 кг) (таблица 4).

Таблица 4 – Объем собранного материала для оценки состояния запасов стерляди в р. Обь в нижнем бьефе НГЭС

Год	Объем выборки, экз.	Сетепостановки, шт.	Плавь, шт.	Массовые промеры, экз.	Определен возраст, экз.
2019	9	60	25	9	–
2021	300	87	30	90	90
2022	282	36	20	63	63
2023	322	16	18	85	85
2024	276	16	15	101	101
2025	307	27	12	85	85

2.1.2 Обоснование выбора методов оценки запаса

В Верхней Оби в Сузунском районе промышленный лов стерляди никогда не проводился. Сбор материалов на биологический анализ проводился при осуществлении научно-исследовательского лова в 2021–2025 гг. и в период 2012–2016 гг.

В р. Обь ниже плотины НГЭС стерлядь выпадает из промысловой статистики с 1971 г., в связи с резким падением численности этого вида. В 1999 г. стерлядь, обитающая в р. Оби ниже плотины НГЭС, была занесена в Красную книгу Новосибирской области. С 2008 г. стерлядь уже на всей акватории Новосибирской области была занесена во второе издание Красной книги Новосибирской области.

Расчет численности вида проведен по результатам плавного сетного лова (учетная съемка) [Сечин, 2010]. Определялось количество выловленных рыб в пересчете на стандартную сеть, длиной 25 м, и один стандартный плав, протяженностью 100 м, с учетом площади облова речного русла. Таким путем определялась концентрация стерляди в количественном (экз./га), а с учетом средней массы выловленных рыб – в весовом отношении (кг/га). Полученные данные экстраполировались на общую площадь речного русла, учитывая его протяженность и среднюю ширину. Таким образом рассчитана численность стерляди р. Оби в Сузунском районе, а также р. Обь ниже плотины НГЭС.

Также для определения величины ОДУ на 2027 г. для запасов стерляди применен программный комплекс методов расчёта допустимого изъятия из запаса – DLMtool [Методические рекомендации..., 2018]. В пакет DLMtool включены методы, работающие в условиях дефицита входной информации (III уровень информационного обеспечения). На встроенной в пакет DLMTool тестовой операционной модели проводится анализ эффективности стратегий управления для схем, определивших величины ОДУ. Результаты диагностики показывают количество предложенных процедур управления с диапазоном оценок ОДУ. Для определения рекомендуемой величины ОДУ применяются методы, показавшие наилучшие результаты в ходе анализа стратегий управления. Входными данными для расчета ОДУ на 2027 г. в р. Обь в Сузунском районе и в нижнем бьефе НГЭС послужили улов на усилие, предыдущие объемы ОДУ, естественная смертность рыб, линейный и возрастной состав рыб в уловах (таблицы 5, 6).

Таблица 5 – Первичные данные для расчета ОДУ стерляди р. Оби в Сузунском районе с использованием программного комплекса DLMtool

Год	Предыдущий ОДУ, т	Вылов*, т	Улов на усилие, т	Естественная смертность (М)	Длина при 50% зрелости, см	Длина при 95% зрелости, см	Длина при первом захвате, см	Длина при полном выборе, см
2021	0,100	0,096	0,0002	0,32	35,7	38,1	16	33,1
2022	0,100	0,099	0,0002					
2023	0,170	0,093	0,0001					
2024	0,130	0,094	0,0001					
2025	0,100	0,096	0,0001					

Таблица 6 – Первичные данные для расчета ОДУ стерляди в р. Оби в нижнем бьефе НГЭС с использованием программного комплекса DLMtool

Год	Предыдущий ОДУ, т	Вылов, т	Улов на усилие, т	Естественная смертность (М)	Длина при 50% зрелости, см	Длина при 95% зрелости, см	Длина при первом захвате, см	Длина при полном выборе, см
2021	0,100	0,095*	0,0001	0,32	33,7	37,5	22	31,5
2022	0,100	0,090*	0,0002					
2023	0,310	0,095*	0,0002					
2024	0,210	0,127**	0,0002					
2025	0,160	0,128**	0,0002					

Примечания: 1. * – вылов в научно-исследовательских целях;

2. ** – вылов в научно-исследовательских целях и целях аквакультуры

Для определения мгновенного коэффициента естественной смертности (M) стерляди использована формула эмпирической зависимости между этой величиной и возрастом массового полового созревания [Бабаян и др., 1984]:

$$M = \frac{1,521}{t_n^{0,720}} - 0,155$$

где M – мгновенный коэффициент естественной смертности;

t_n – возраст массового полового созревания (в р. Обь в Сузунском районе и в нижнем бьефе НГЭС – 5 + лет) [Журавлев, 2003; Попов, 2007].

2.2 Ретроспективный анализ состояния запаса и промысла

До создания Новосибирского водохранилища на речном участке в пределах Новосибирской области, включая район будущего затопления, обитало 22 вида рыб, общий вылов составлял около 300 т [Лузанская Д. И., Савина, 1956].

В период 1946–1949 гг. в уловах доминировали плотва и щука, на ценные виды (осетр, стерлядь, таймень, нельма) приходилось около 6,2 т. Более 61% от этого количества составляла стерлядь (3,8 т). В р. Обь этот вид был распространен повсеместно и его вылов составлял более 7 кг на 1 км протяжения речной акватории.

Образование Новосибирской ГЭС оказало большое влияние на численность и распределение стерляди, расчленив ареал прежде единой популяции верхнеобской стерляди. После зарегулирования р. Обь прекращается специализированный промысел стерляди на речном участке выше и ниже водохранилища, но она активно вылавливается в Новосибирском водохранилище, куда скатывается на нагул большинство речных рыб.

Река Обь в Сузунском районе. В бассейне Верхней Оби до плотины Новосибирской ГЭС ареал стерляди включает акватории обитания локальных стад, приуроченные к местам нереста и зимовки, между которыми совершаются ежегодные миграции рыб. Наиболее четко обособлено стадо стерляди в Новосибирском водохранилище и примыкающем к нему участке русла Оби; другие локальные группировки приурочены к нижним участкам главных притоков и выделены как чумышское, алейское, чарышское и ануйское стада [Журавлев, 2003].

В настоящее время ареал стерляди сократился вследствие негативного антропогенного воздействия, в том числе загрязнения русловых участков в черте промышленных городов, разработки галечно-гравийных месторождений.

На участке Оби выше водохранилища стерлядь перестала фигурировать в промысловой статистике с середины 1970-х годов. За период 1956–1975 гг. среднегодовые уловы вида снизились с 6 до 1 т, но с учетом любительского вылова они остались на уровне 2–3 т в год. До конца 1990-х годов численность стерляди на этом участке Оби оставалась сравнительно высокой, но отмечался чрезмерный вылов старшевозрастных групп [Соловов, 1998]. В 1990-е годы в небольших количествах по лицензиям стерлядь вылавливалась и на территории Сузунского района. Данные об объемах лицензионного лова отсутствуют.

С 2008 г. стерлядь на этой акватории занесена в список видов Красной книги Новосибирской области, утвержденный 21 июля 2008 г. Постановлением Главы администрации Новосибирской области № 200-па. В настоящее время в промысловых уловах в Сузунском районе стерлядь единично присутствует как прилов в сетных орудиях.

Стерлядь на акватории Оби в пределах Сузунского района обитает в течение всего года. Основная масса разновозрастных особей появляется на данном отрезке реки после ледохода в период паводка и осуществляет интенсивный нагул. Продолжительность нагула определяется, главным образом, уровнем воды. В период залития поймы происходит краткосрочный нагул молоди стерляди в протоках и затонах. С июня, по мере падения уровня воды, основной нагул происходит в русле Оби. В основном русле происходят весенние миграции в высоко кормное Новосибирское водохранилище и осенний подъем к местам нереста и зимовки. В зимний период стерлядь малочисленна.

Распределение стерляди на речном участке Верхней Оби выше водохранилища на территории Сузунского района впервые было изучено в 2012–2016 гг., в 2020–2025 гг. наблюдения были продолжены. Как показали наблюдения, концентрация нагульной и мигрирующей стерляди на Сузунском участке р. Обь варьирует в широких пределах в зависимости от гидрологического режима весеннего половодья [Дорогин и др., 2014; 2015].

В 2012–2016 гг. доля стерляди в уловах донных плавных сетей в русле Оби составляла 0,41–0,5 экз. на один стандартный плав, протяженностью 100 м.

В апреле – мае 2019 г. в условиях экстремально низкого весеннего паводка, численность стерляди была крайне мала. Всего выловлено донными плавными сетями 2 экз. молоди. В июне вылов составил 2 взрослых особи и 3 экз. молоди.

В 2020–2022 гг. и 2024 г. основной нагул стерляди в р. Оби проходил в июле. Средний вылов стерляди в этот период, в пересчете на стандартную сеть длиной 25 м и один стандартный плав протяженностью 100 м, достигал наибольших сезонных значений – 0,38 экз. (в 2020 г.) – 0,74 экз. (в 2022 г.) (таблица 7). В сентябре охлаждение воды и понижение уровня снизило интенсивность нагула и ускорило миграцию стерляди с Сузунского участка Оби. Уловы уменьшаются до 0,15 (в 2022 г.) – 0,37 экз. за плав (в 2024 г.).

Таблица 7 – Видовой состав уловов научно-исследовательских уловов (плавные сети) в русле Оби в 2020–2025 гг. (Сузунский район)

Месяц	Виды рыб, экз./плав								
	осетр*	стерлядь	щука	лещ	плотва	язь	сазан	окунь	судак
2020 г.									
Апрель	0,25	0,09	–	–	–	0,01	–	–	–
Июль	0,69	0,38	0,01	0,81	0,27	0,12	–	0,01	0,03
Октябрь	0,38	0,02	0,14	0,60	0,38	0,10	0,02	0,06	0,06
2021 г.									
Июль	0,76	0,61	0,02	0,12	–	0,18	–	0,01	–
Сентябрь	0,30	0,32	0,37	1,04	0,47	0,08	–	0,02	0,19
Октябрь	0,17	0,06	0,22	0,22	0,56	–	–	–	0,11
2022 г.									
Апрель	0,30	0,23	–	–	–	–	–	–	–
Июль	0,34	0,74	–	0,22	–	0,03	–	–	0,02
Сентябрь	1,12	0,15	0,04	1,57	0,08	0,12	–	–	0,03
Октябрь	0,47	0,07	–	0,40	0,20	–	–	0,07	0,20
2023 г.									
Апрель	0,23	0,2	–	–	–	–	–	–	0,04
Июль	0,94	0,52	–	0,14	0,06	0,03	–	–	0,03
Сентябрь	0,35	0,69	0,03	0,66	0,04	0,15	–	0,02	0,03
Октябрь	0,04	0,02	0,12	0,34	0,14	–	–	0,13	0,04
2024 г.									
Апрель	0,47	0,07	–	3,33	–	–	–	–	–
Июль	0,37	0,54	0,12	0,74	–	0,14	–	0,01	0,14
Сентябрь	0,06	0,37	0,83	0,61	0,11	–	–	0,25	0,24
Октябрь	0,03	0,11	2,08	1,02	0,23	0,05	–	0,33	0,28
2025 г.									
Апрель	0,28	0,10	–	0,04	–	0,04	–	–	–
Июль	0,42	0,75	0,03	0,42	–	0,07	–	0,03	0,42
Сентябрь	0,14	0,48	0,06	0,11	0,02	0,02	–	0,02	0,11
Октябрь	0,06	0,10	0,16	0,14	–	0,02	–	–	0,14

Примечание: * – весь прилов осетра незамедлительно выпускался обратно в водоем в живом виде, согласно п. 15.4.5 Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

В 2023 г. и 2025 г. основной нагул стерляди был более продолжительным и осуществлялся с июля по конец сентября, что было обусловлено особенностями гидрологического режима Оби. В 2023 г. повышенный уровень воды наблюдался в летний период. В июле средний вылов стерляди составил 0,52 экз., а в начале сентября увеличился до 0,69 экз. за плав. В 2025 г. уровень воды в летний период был ниже среднееголетних значений (см. рисунок 2), что обусловило повышенную концентрацию стерляди на местах нагула в русле Оби. В июле вылов на плав составил 0,75 экз. Экстремально высокий и продолжительный осенний паводок, проходивший с середины августа до конца октября, улучшил условия осеннего нагула стерляди. В результате миграции стерляди на залитые прирусловые и пойменные участки, в сентябре ее уловы снизились до 0,48 экз. за плав, а с охлаждением воды в октябре – до 0,10 экз.

В октябре нагул стерляди завершается, и большая ее часть покидает акваторию Сузунского района. В период с октября по декабрь в уловах встречаются только неполовозрелые особи и в небольших количествах. В 2021–2023 гг. в октябре перед ледоставом уловы составляли 0,02–0,07 экз./плав. В 2024–2025 гг. повышенный уровень воды в осенний период, относительно большинства лет наблюдений (см. рисунок 2), способствовал продлению нагула стерляди. Средние уловы стерляди в октябре 2024–2025 гг. превысили показатели 2020–2023 гг. наблюдений, составив 0,11–0,10 экз. за плав соответственно.

В ноябре – декабре 2021 г. в контрольных уловах ставных сетей средний вылов стерляди на 1 сетесутки составлял 0,08 экз., в 2024–2025 гг. – 0,09–0,11 экз., в подледный период 2022–2023 гг. стерлядь в уловах отсутствовала.

Средний вылов стерляди за период наблюдений по открытой воде в апреле – октябре 2025 г., в пересчете на стандартную сеть длиной 25 м и один стандартный плав, протяженностью 100 м, был на уровне показателей 2021–2024 гг. (0,40 экз. (1,6 экз./га) – 0,53 экз. (2,1 экз./га)), и составил 0,47 экз. (1,9 экз./ га). Численность стерляди составила 6,8 тыс. экз., биомасса (при средней массе 0,309 кг) – 2,1 т (таблица 8).

Таблица 8 – Динамика вылова, численности и биомассы стерляди р. Обь в Сузунском районе

Год	Средний вылов, экз./плав	Численность, тыс. экз.	Биомасса, т	Вылов, т*	ОДУ, т
2020	0,33	6,0	1,2	-	-
2021	0,42	6,0	2,2	0,096	0,100
2022	0,53	7,7	2,7	0,099	0,100
2023	0,50	7,2	2,0	0,093	0,137
2024	0,40	5,7	1,9	0,094	0,114
2025	0,47	6,8	2,1	0,096	0,100

Примечание: * – Вылов в научно-исследовательских целях

Участок основного размножения стерляди расположен в верховьях ареала – от слияния Бии и Катунь, включая нижнее течение всех крупных притоков, и простирается до устья р. Алей.

Верхнеобская стерлядь становится половозрелой в возрасте от 4+ до 6+ лет. Нерест начинается у самцов в 4+ и 5+ лет (62,2%), самок – в 5+ и 6+ лет (47,7%) [Журавлев, 2006]. Плодовитость стерляди в верховьях Оби составляет 4,5–35 тыс. икринок. Средняя

абсолютная плодовитость самок возрастного модального класса 5+ и 6+ лет составила 14,7 тыс. икринок (колебания 9,1–22,6 тыс. икринок) [Соловов, 1997; 1998].

Соотношение самцов и самок, по результатам проведенных исследований 2025 г., у особей стерляди длиной 16–48 см и массой 24–870 г составляло 1,3:1.

В 2020 г. на р. Обь в границах Сузунского района на участке русла протяженностью 35 км было обследовано 8 потенциальных мест нереста осетровых рыб, грунты которых представлены крупнозернистыми песками в районе сел Верхний Сузун, Нижний Сузун, Малышево, Поротниково и Каргаполово. В 2020–2025 гг. в сетных и личиночных орудиях лова текущие особи стерляди, их икра и ранняя молодь не отмечались, что свидетельствует об отсутствии ее воспроизводства на данном участке, несмотря на наличие потенциальных мест нереста.

Выявлено три участка пригодных для зимовки осетровых рыб: с. Малышево (430 км ЛК), с. Каргаполово (440 км ЛК) и с. Тараданово (445 км ЛК). Проведено 78 промеров глубин и взято 14 проб грунта.

Размеры стерляди в Сузунском районе в 2013–2016 и 2019–2020 гг. колебались от 15 до 50 см, но преобладающее значение имели особи с длиной 26–35 см. Средняя длина рыб колебалась незначительно – от 28,6 до 31,5 см. В 2021 г. размеры стерляди составляли 13–57 см, в 2022 г. – 15–67 см, в 2023–2025 гг. – 16–49 см. Преобладающее значение имели рыбы с длиной тела 31–40 см: в 2021 г. их доля составляла 47,7%, в 2022 г. – 69,6 %, в 2023 г. – 58,1 %, в 2024–2025 гг. – 61,7–65,6 % (таблица 9).

Таблица 9 – Размерный состав стерляди на Сузунском участке р. Обь

Год	Показатель	Длина, см							Средняя длина, см	Кол-во экз.
		13-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-60	60-70		
2013	экз.	9	9	67	69	6	1	1	30,7	153
	%	5,6	5,6	41,4	42,6	3,7	0,6	0,6		
2014	экз.	6	6	50	47	23	2	–	31,5	128
	%	4,5	4,5	37,3	35,1	17,2	1,5	–		
2015	экз.	12	92	65	7	1	1	–	29,8	178
	%	6,7	51,7	36,5	3,9	0,6	0,6	–		
2016	экз.	17	23	19	2	1	–	–	28,6	62
	%	27,4	37,2	30,6	3,2	1,6	–	–		
2019	экз.	5	–	1	1	–	–	–	24,7	8
	%	71,4	–	14,3	14,3	–	–	–		
2020	экз.	15	48	32	12	–	–	–	29,5	107
	%	14,0	44,9	29,9	11,2	–	–	–		
2021	экз.	15	17	31	32	25	12	–	35,5	132
	%	11,4	12,9	23,5	24,2	18,9	9,1	–		
2022	экз.	26	18	69	103	26	4	1	35,0	247
	%	10,5	7,3	27,9	41,7	10,6	1,6	0,4		
2023	экз.	25	45	62	60	17	1	–	32,8	210
	%	11,9	21,4	29,5	28,6	8,1	0,5	–		
2024	экз.	6	17	25	41	14	4	–	35,2	107
	%	5,6	15,9	23,4	38,3	13,1	3,7	–		
2025	экз.	9	20	45	37	10	4	–	34,2	125
	%	7,2	16,0	36,0	29,6	8,0	3,2	–		

Возраст вылавливаемых рыб составляет 1+...16+ лет. Среди нагульных рыб преобладает молодь и особи в возрасте до 5 лет: в 2021–2022 гг. и 2024 г. их доля составляла 62,9–76,1 %, в 2023 и 2025 гг. – 89,5 и 81,6 % соответственно. В 2025 г. средний возраст был ниже показателей прошлого года (4,3 года) и 2021–2022 гг. (4,7–4,3 года соответственно), составив 3,8 года. В период 2013–2016 гг. и 2023 г. средний возраст изменялся от 2,9 года (в 2015 г.) до 3,6 года (в 2013 г.).

По материалам наблюдений 2013–2016 гг. темп роста стерляди в Верхней Оби относительно стабилен. По результатам исследований 2021–2025 гг. наблюдается увеличение средней длины и массы в возрастных группах 3+...6+ лет (таблица 10, 11).

Стерлядь является типичным бентофагом. Спектр питания стерляди в основном составляют следующие группы зообентоса: личинки хирономид (Chironomidae), мошек (Simuliidae), поденок (Ephemeroptera) и стрекоз (Odonata), а также моллюски (Mollusca) [Журавлев, 2006].

Таблица 10 – Показатели роста стерляди р. Обь в Сузунском районе

Возраст	Длина, см					Масса, г				
	2016 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2016 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1+	<u>23,0*</u> 19–29	<u>21,4</u> 13–26	<u>22,9</u> 15–25	<u>22,4</u> 16–26	<u>20,0</u> 18–26	<u>73,0</u> 37–119	<u>76,5</u> 40–130	<u>81,6</u> 61–95	<u>71,1</u> 30–133	<u>82,0</u> 56–124
2+	<u>25,5</u> 22–31	<u>29,1</u> 26–32	<u>28,8</u> 25–32	<u>28,7</u> 26–34	<u>27,6</u> 26–30	<u>103,5</u> 49–186	<u>153,1</u> 113–226	<u>157,4</u> 127–220	<u>151,7</u> 96–213	<u>134,4</u> 105–174
3+	<u>29,0</u> 26–33	<u>31,9</u> 28–35	<u>32,2</u> 29–36	<u>32,4</u> 29–36	<u>32,9</u> 31–34	<u>148,4</u> 86–226	<u>224,2</u> 119–313	<u>252,2</u> 185–374	<u>238,9</u> 161–320	<u>238,5</u> 181–287
4+	<u>30,5</u> 28–34	<u>34,3</u> 28–38	<u>34,9</u> 30–39	<u>36,3</u> 31–39	<u>35,5</u> 34–37	<u>169,3</u> 133–236	<u>288,6</u> 130–426	<u>322,0</u> 236–490	<u>357,3</u> 201–430	<u>310,9</u> 288–372
5+	<u>33,4</u> 30–36	<u>36,9</u> 31–41	<u>37,0</u> 32–40	<u>38,2</u> 36–41	<u>38,1</u> 37–39	<u>240,1</u> 156–380	<u>357,6</u> 174–587	<u>381,8</u> 279–524	<u>421,2</u> 367–503	<u>373,4</u> 325–450
6+	<u>36,5</u> 34–39	<u>39,8</u> 37–43	<u>39,9</u> 36–44	<u>40,6</u> 39–42	<u>39,7</u> 38–41	<u>367,5</u> 267–468	<u>450,1</u> 222–623	<u>458,8</u> 362–600	<u>504,4</u> 460–567	<u>468,8</u> 391–547
7+	–	<u>42,4</u> 39–46	<u>43,1</u> 39–46	<u>43,0</u> –	<u>42,2</u> 41–43	–	<u>546,9</u> 335–722	<u>644,4</u> 490–836	<u>600,0</u> 547–653	<u>544,9</u> 475–625
8+	–	<u>43,3</u> 41–47	<u>46,0</u> –	<u>47,0</u> –	<u>46,3</u> 45–47	–	<u>616,6</u> 511–832	<u>781,0</u> –	<u>1008,0</u> –	<u>732,8</u> 670–849
9+	–	<u>47,2</u> 44–50	–		<u>49,0</u> –	–	<u>787,3</u> 627–1086	–		<u>708,0</u> –
10+	<u>43,0</u> –	<u>50,3</u> 49–53	<u>50,0</u> –		–	<u>687,0</u> –	<u>893,5</u> 701–1198	<u>774,0</u> –		–
11+	–	–	<u>56,0</u> –		–	–	–	<u>1960,0</u> –		–
14+	–	<u>57,0</u> –	–		–	–	<u>1656,0</u> –	–		–
16+	–	–	<u>67,0</u> –		–	–	–	<u>3090,0</u> –		–

Примечание: * – В числителе – среднее, в знаменателе – колебания

Таблица 11 – Размерно-возрастная характеристика стерляди р. Обь в Сузунском районе, 2025 г.

Возраст	Длина, см		Масса, г		Кол-во, экз.	Доля, %	Определен возраст, экз.
	средняя	колебания	средняя	колебания			
1+	22,2±1,00	16–26	75,9±13,10	24–145	10	8,0	9
2+	29,3±0,27	26–31	162,4±6,50	110–267	25	20,0	25
3+	33,1±0,23	31–35	247,0±7,03	174–314	29	23,2	28
4+	35,7±0,27	33–38	320,2±9,23	242–379	21	16,8	20
5+	38,1±0,20	37–39	404,7±11,98	296–484	17	13,6	17
6+	39,8±0,20	39–41	450,2±11,54	380–500	11	8,8	10
7+	43,0±0,52	41–44	587,2±32,00	498–675	6	4,8	6
8+	46,3±0,48	45–47	756,5±45,53	677–870	5	4,0	4
9+	48,0	–	816,0	–	1	0,8	1
Итого	34,2±0,53	16–48	309,3±15,03	24–870	125	100	120

В реке значительно развит браконьерский сетной промысел. Так в 2025 г. органами рыбоохраны пресечено 129 нарушений правил рыболовства, у нарушителей изъято 637 орудий лова. Только в этих орудиях, по экспертной оценке, браконьерский вылов составил 130 экз. общим весом около 40 кг.

Большое влияние на популяцию стерляди на акватории Сузунского района оказывает любительское рыболовство. На данном участке реки этот вид был внесен в Красную книгу лишь в 2008 г., а до этого разрешался ее вылов по лицензиям. Поэтому у населения до настоящего времени сохранились навыки отлова стерляди любительскими снастями, с применением специальных наживок.

Обычна стерлядь и в прилове при добыче других бентосоядных рыб в русле Оби и в крупных протоках в годы с повышенной водностью. По результатам наблюдений, в летний период 2020–2025 гг. средний прилов стерляди на одного рыбака с донными удочками составлял 2 экз.

Река Обь в нижнем бьефе НГЭС. В нижнем бьефе Новосибирской ГЭС стерлядь обитает от плотины до границ с Томской областью. Акватория используется для нереста и для нагула в летнее время. В подледный период стерлядь, вероятно, мигрирует на участки реки в границах Томской области, так как отсутствует в уловах и на зимовальных ямах.

На этом участке стерлядь выпадает из промысловой статистики после 1970 г. [Сецко, 1976]. Непосредственно перед строительством плотины НГЭС вылов половозрелой стерляди для целей рыбоводства в мае – июне достигал 634 экз. [Вотинов и др., 1957]. В первое десятилетие после перекрытия Оби наблюдался массовый подход стерляди к плотине ГЭС, и она встречалась во все сезоны года [Еньшина, 1997]. Стационарные наблюдения за видовым составом уловов, проведенные в 1969–1971 гг. показали, что с учетом всех видов промысла в 1969 г. было выловлено 1059 экз. стерляди (в т.ч. 699 экз. молоди), в 1970 г. – 640 экз. (в т.ч. 201 экз. молоди), в 1971 г. – 1045 экз. стерляди (в т.ч. 426 экз. молоди). Средний суточный вылов на одну ставную сеть составлял 11–13 экз.

В последующий период, до середины 1980-х годов, стерлядь поднималась к плотине преимущественно на зимовку. В стаде отсутствовали особи готовые к нересту предстоящей весной. Вылов на одну сеть в приплотинной зоне нижнего бьефа НГЭС

снизились до 5–10 экз., а после второй половины 1980-х годов – до 0,09–0,11 экз. Залавливалась преимущественно молодь со средней длиной 25,4 см и массой 104,8 г.

Нагул стерляди в городской черте наблюдается в многоводные и средние по водности годы в летние месяцы на русловых участках, недоступных для всех видов сетного лова. По данным органов МВД, незаконная добыча стерляди на этой акватории проводится с применением самоловной крючковой снасти и вылов на 1 такой самолов из 100 крючков достигает 12–14 экз.

Ниже г. Новосибирска стерлядь была обычна до 1990-х годов, что позволяло вести ее отлов для целей искусственного воспроизводства (таблица 12). В начале 2000-х годов стерлядь встречалась уже единично, но регулярно.

Таблица 12 – Видовой состав контрольных уловов рыб в р. Обь

Годы	Вид рыб, %									Всего, экз.
	стерлядь	язь	плотва	елец	лещ	щука	судак	окунь	прочие*	
1980-е	4,5	22,0	17,0	2,1	20,4	4,0	18,1	7,9	4,0	240
1990-е	1,0	12,5	6,9	2,0	32,0	3,0	22,9	18,0	1,7	194
2000-е	0,7	9,0	17,9	9,4	19,6	8,6	18,7	13,9	2,2	1510

Примечание: * – карась, ерш, налим

В 2012–2016 гг. по данным ихтиологического наблюдательного пункта произошло снижение вылова стерляди до 0,02–0,07 экз. на сеть. В то же время произошло улучшение биологических показателей стерляди – длина тела увеличилась до 31,8 см, масса – до 253 г.

Контрольные ловы 2019 г. также показали низкую численность стерляди – всего выловлено и выпущено в р. Обь 9 экз. Улов на одну стандартную сеть длиной 25 м составил 0,03–0,05 экз. В контрольных ловах 2020 г. стерлядь отсутствовала, так как не наблюдалось обычного подхода стерляди к плотине НГЭС, что, вероятно, связано с работами в русле Оби и перекрытием одной из протоков, при проведении строительных работ в прибрежной зоне и возведении мостового перехода.

В 2021 г. в р. Оби в нижнем бьефе НГЭС в границах Новосибирской области стерлядь отмечалась в июне – августе. Вылов ее на стандартную сеть длиной 25 м за один стандартный плав протяженностью 100 м составил 0,38 экз. (1,51 экз./га) (таблица 13). Численность стерляди составила 14,3 тыс. экз., биомасса – 4,3 т.

Таблица 13 – Динамика вылова, численности и биомассы стерляди р. Обь в нижнем бьефе НГЭС в 2021–2025 гг.

Год	Средний вылов, экз./плав	Численность, тыс. экз.	Биомасса, т	Вылов, т	ОДУ, т
2021	0,38	14,3	4,3	0,095*	0,100
2022	0,70	26,7	8,5	0,090*	0,100
2023	0,66	26,5	7,8	0,095*	0,119
2024	0,57	22,8	8,0	0,127**	0,176
2025	0,65	26,1	8,3	0,128**	0,137

Примечания: 1. * – вылов в научно-исследовательских целях;

2. ** – вылов в научно-исследовательских целях и целях аквакультуры

В 2022–2023 гг. стерлядь в р. Оби в границах Новосибирской области присутствовала с конца мая по первую декаду июля, а в 2024 г. – с конца июля по третью декаду августа. В 2025 г. нагул стерляди был более продолжительным и проходил с июня

по октябрь, чему способствовал повышенный уровень воды в осенний период, относительно большинства лет наблюдений (см. рисунок 3).

Средний вылов стерляди за один плав протяженностью 100 м в 2022–2023 гг. и 2025 г. изменялся от 0,65 (2,6 экз./га) до 0,70 экз. за плав (2,8 экз./га). Численность составляла близкие значения – 26,1 (в 2025 г.) – 26,7 тыс. экз. (в 2022 г.). Биомасса стерляди в 2025 г. составила 8,3 т (при средней массе 0,319 кг) (см. таблицу 13).

Снижение уровня воды в ноябре способствовало скату стерляди за пределы Новосибирской области. Размеры стерляди в уловах 2025 г. колебались от 22 до 47 см, возраст – от 1+ до 9+ лет. Основу нагульного стада составляли трех – пятилетние особи, с длиной 26–36 см, доля которых составляла 61,2 % (таблица 14). В предыдущие четыре года наблюдений, основу стада составляли трех – четырехлетние особи – их доля снижалась с 75,6 % (2021 г.) до 53,9 % (2022 г.) и 48,2–48,5 % (2023–2024 гг.)

Таблица 14 – Размерно-возрастная характеристика стерляди р. Обь в нижнем бьефе НГЭС в 2025 г.

Возраст	Длина, см		Масса, г		Количество	
	средняя	колебания	средняя	колебания	экз.	%
1+	24,0±0,71	22–26	109,8±17,35	70–160	5	5,9
2+	28,3±0,28	26–30	163,1±6,70	110–200	16	18,8
3+	31,5±0,36	28–34	237,0±7,77	174–314	21	24,8
4+	33,7±0,33	32–36	309,8±17,43	220–452	15	17,6
5+	37,5±0,41	36–40	399,5±28,88	267–600	11	12,9
6+	39,4±0,50	37–41	484,3±35,29	354–645	8	9,4
7+	42,8±0,58	41–44	590,0±39,22	498–675	5	5,9
8+	45,0±0,50	44–46	681,7±11,67	660–700	3	3,5
9+	47,0	–	1100,0	–	1	1,2
Итого	33,7±0,60	22–47	319,4±19,48	70–1100	85	100

Увеличение доли старшевозрастных особей в 2025 г. привело к увеличению среднего возраста относительно предыдущего года до 3,9 лет (в 2024 г. – 3,7 лет). Средняя масса рыб в 2025 г. была близка к показателям 2021–2023 гг. и составила 319,4 г. (в 2021 г. – 299,8 г., в 2022 г. – 319,4 г., в 2023 г. – 295,2 г.). Размерно-весовые показатели стерляди в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС в возрасте 1+...8+ лет в 2025 г. оказались на уровне данных последних лет (таблица 15).

Естественное воспроизводство стерляди в многоводные годы наблюдается на довольно протяженном участке р. Оби – от с. Почта до с. Камень (764–820 км ЛК). В нересте участвуют рыбы из среднеобской популяции, поднимающиеся из Томской области [Визер, Горцева, 2012]. Так в многоводный 2010 г. на галечниковых грунтах Оби в районе с. Почта отмечен нерест и последующий скат личинок стерляди. Ее доля в составе покатной молоди составила 1,5 % в русле и 0,1 % в крупных прирусловых протоках.

Таблица 15 – Показатели роста стерляди р. Обь в нижнем бьефе НГЭС

Возраст	Длина, см				Масса, г			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1+	<u>24,0*</u> –	<u>23,0</u> –	<u>24,2</u> 23–26	<u>25,6</u> 24–27	<u>115,0</u> 110–120	<u>120,0</u> –	<u>97,2</u> 64–133	<u>136,6</u> 110–160
2+	<u>28,5</u> 26–31	<u>28,0</u> 26–29	<u>29,5</u> 26–32	<u>28,0</u> 26–30	<u>197,5</u> 152–337	<u>160,0</u> 170–150	<u>173,5</u> 137–213	<u>175,6</u> 148–198
3+	<u>31,1</u> 28–35	<u>30,4</u> 25–33	<u>30,8</u> 25–34	<u>29,5</u> 28–31	<u>254,1</u> 179–338	<u>195,0</u> 120–260	<u>211,1</u> 120–300	<u>211,6</u> 170–250
4+	<u>33,1</u> 31–35	<u>34,0</u> 30–37	<u>34,6</u> 32–38	<u>32,5</u> 29–36	<u>335,3</u> 230–372	<u>274,0</u> 170–440	<u>290,7</u> 170–440	<u>306,1</u> 221–468
5+	<u>33,0</u> –	<u>35,6</u> 34–38	<u>35,9</u> 34–38	<u>37,2</u> 35–40	<u>380,0</u> –	<u>326,3</u> 240–450	<u>337,7</u> 240–450	<u>510,6</u> 415–600
6+	<u>40,7</u> 38–43	<u>41,1</u> 37–45	<u>40,4</u> 37–43	<u>40,3</u> 39–41	<u>786,2</u> 652–880	<u>476,7</u> 330–660	<u>459,8</u> 330–660	<u>642,5</u> 587–780
7+	–	<u>42,6</u> 39–46	<u>41,8</u> 39–43	<u>43,3</u> 42–45	–	<u>586,0</u> 320–710	<u>573,3</u> 320–710	<u>882,3</u> 680–998
8+	–	<u>45,0</u> 43–47	<u>46,0</u> –	<u>46,0</u> 45–47	–	<u>660,0</u> 620–700	<u>540,0</u> –	<u>1306,3</u> 1274–1350

Примечание: – * В числителе – среднее, в знаменателе – колебания

В контрольных уловах на нерестилищах присутствует до 30 % неполовозрелых особей. Самки начинают созревать в 4 + лет, самцы – в 3 + лет. Среди половозрелой части выборки соотношение самцов и самок близко к соотношению 1,5:1. Индивидуальная абсолютная плодовитость варьирует от 4072 до 8346 шт., в среднем – 5478 шт. [Интересова, 2017].

Площадь потенциальных нерестилищ литофильных видов рыб, установленная в 2019 г. в р. Оби в нижнем бьефе НГЭС, составляет около 441 га (рисунок 4).




Рисунок 4 – Схема расположения нерестилищ стерляди в р. Обь Новосибирской области

В 2020 г. были проведены наблюдения на 7 потенциальных нерестилищах осетровых рыб (709, 720, 759, 761, 764, 774, 782–784 км ЛК) с галечниковыми и песчано-галечниковыми грунтами. При проведении личиночных ловов особое внимание уделялось акватории в районе поселка Почта (764 км ЛК), где в 2010 г. залавливались личинки стерляди [Визер, Горцева, 2012]. Было установлено, что в 2020 г. нерест стерляди проходил на участке реки от с. Почта до с. Успенка (763–784 км ЛК). В третьей декаде мая численность предличинок стерляди на участках с галечниковыми грунтами составляла 26,3% от всей ранней молоди. Молодь стерляди присутствовала на двух станциях, где ее численность составляла 0,00763 и 0,01425 экз./м³. На других участках, включая акваторию г. Новосибирска, икра и ранняя молодь осетровых рыб отсутствовала. В июне 2025 г. было проведено 19 ловов ихтиопланктонными ловушками, личинок осетровых рыб в уловах не отмечалось.

Незаконный промысел стерляди и охрана ее запасов. Браконьерский промысел осетровых рыб в Оби ниже плотины НГЭС в границах Новосибирской области осуществляется преимущественно самоловными крючковыми снастями. По данным опросов сотрудников МВД, инспекторов рыбоохраны и граждан, основной браконьерский промысел проводится на участке Оби от северной окраины г. Новосибирска до границы с Томской областью. Вылов стерляди на 100 самоловных крючков в 2022–2025 гг. составлял 2–10 экз. Всего за 2025 год было изъято 10 колющих орудий лова, большинство которых составили самоловы.

Вследствие хорошей оснащенности и организации браконьерских самоловных групп, они, несмотря на малочисленность, оказывают значительное влияние на популяцию стерляди. Большой урон стерляди наносит и сетной промысел, при котором она изымается лишь в качестве прилова. Основной вылов наблюдается в многоводные годы при массовом подходе стерляди из Томской области. По опросным данным незаконной добычей стерляди занимались на всем протяжении реки от границы г. Новосибирска до Томской области, преимущественно вблизи населенных пунктов и дачных обществ. Сезонный улов постоянных групп находится в пределах 110–150 кг и общий вылов, по экспертной оценке, может превышать 2 т, что составляет 24,1 % от расчетной биомассы стада в 2025 г.

В уловах рыбаков-любителей на участке реки ниже плотины НГЭС стерлядь не отмечается, так как после зарегулирования Оби, численность этого вида резко снизилась, а ее кормовая нерестовая миграция из Томской области зависит от гидрологического режима. Определенную роль в сокращении специализированного лова осетровых рыб сыграло и внесение стерляди в Красную книгу Новосибирской области в 1999 г. [Красная книга..., 2018].

Охраной запасов ценных видов рыб занимаются участковые инспектора рыбоохраны. Для повышения эффективности этой работы Верхнеобским территориальным управлением Росрыболовства проводятся рейды по пресечению незаконного вылова осетровых рыб, с привлечением общественных инспекторов и сотрудников МВД. Активное участие в пресечении незаконной транспортировки и оборота этих видов принимают сотрудники МВД и пограничные управления ФСБ России.

Искусственное воспроизводство стерляди. На территории Новосибирской области функционируют три предприятия, располагающие рыболовными мощностями, ориентированными на инкубацию икры и подращивание молоди рыб, в том числе для

целей искусственного воспроизводства осетровых видов рыб (сибирский осетр, стерлядь): ООО «Рыбхоз», инкубационный цех ООО «Новосибирский рыбозавод» и экспериментальный рыбоводный пункт Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Инкубационный цех ООО «Новосибирский рыбозавод» и экспериментальный рыбоводный пункт Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в настоящее время не располагают маточными стадами стерляди.

ООО «Рыбхоз» имеет собственное ремонтно-маточное стадо стерляди. В 2023 г. в р. Обь в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС было выпущено 3000 экз. молоди (сеголетков) стерляди, массой не менее 3,0 г. Выпуск молоди осуществлялся на участке (55°21'32.4" с.ш. 82°47'02.6" в.д.) за чертой г. Новосибирска, что будет способствовать увеличению численности стерляди на данном участке р. Оби. Исходя из промыслового возврата 0,295 от выпуска молоди массой 3,0 г [Методика исчисления..., 2020], увеличение численности стада стерляди ожидается в количестве 885 экз.

В 2024 и 2025 гг. выпуски молоди стерляди не производились, однако, ООО «Рыбхоз» в р. Оби ниже плотины НГЭС в границах Новосибирской области в целях аквакультуры (искусственного воспроизводства) ежегодно вылавливалось 30 кг стерляди. Отловленные экземпляры были использованы для улучшения генетического разнообразия ремонтно-маточного стада стерляди.

В 2026 и 2027 гг. также планируется отлов особей стерляди в р. Оби в нижнем бьефе НГЭС для улучшения генетического разнообразия ремонтно-маточного стада стерляди ООО «Рыбхоз».

2.3 Определение биологических ориентиров

Обоснование ОДУ стерляди производится на основе предосторожного подхода [Бабаян, 2000; Шибаев, 2014], который трактуется как концепция промыслового использования водных биоресурсов, обеспечивающая биологическую безопасность эксплуатируемых запасов. ОДУ рассматривается как некоторый управляющий параметр, а не биологическое средство, отражающее продуктивность эксплуатируемой популяции. Применяются целевые, граничные и буферные ориентиры.

Граничный ориентир по биомассе показывает предел состояния системы запас – промысел, который не должен быть перейден. Для данного ориентира нами принимается биомасса наименьшего промыслового запаса стерляди: в Сузунском районе – 1,2 т, в нижнем бьефе НГЭС – 4,3 т (см. таблицы 8, 13).

Буферный ориентир по уловам является индикатором для принятия превентивных мер по управлению системой, чтобы не допустить ее приближения к граничному ориентиру. В качестве буферного ориентира принимается средняя биомасса запаса – в Сузунском районе – 2,2 т, в нижнем бьефе НГЭС – 7,4 т.

Целевой ориентир управления устанавливает цель, к которой должен стремиться рациональный промысел. Такой целью нами принимается величина общих допустимых уловов (ОДУ) в научно-исследовательских целях и в целях аквакультуры.

2.4 Правила регулирования промысла

Согласно нашим расчетам [Сечин, 2010], текущая биомасса запаса стерляди для Верхней Оби в Сузунском районе составляет 2,1 т, для Верхней Оби в нижнем бьефе НГЭС – 8,3 т. Идентификация зонального ПРП осуществляется с помощью двух пар биологических ориентиров: граничных и целевых по биомассе нерестового или промыслового запаса и промысловой смертности, скорректированных с учетом доверительных интервалов этих оценок. Оценка индексов биомассы (B , $BMSY$) и промысловой смертности (F , $FMSY$) стерляди на 2027 г. с использованием программы DLMtool представлена в таблице 16. Согласно расчетным данным в 2027 г. показатель биомассы (B) стада стерляди больше биомассы максимально устойчивого улова ($BMSY$), показатель промысловой смертности (F) меньше промысловой смертности максимально устойчивого улова ($FMSY$), что предполагает безопасное использование части запаса.

Исходя из этого, определяются следующие границы допустимой (биологически безопасной) области управления данного запаса: изымаемая биомасса не должна приводить к сокращению запаса. ОДУ определяется только в научно-исследовательских целях и в целях аквакультуры.

2.5 Прогнозирование состояния запаса

В 2025 г. проводился научно-исследовательский лов на обоих участках Оби, в ходе которого были собраны данные о численности и размерно-возрастной структуре стад стерляди. Эти данные использовались для оценки численности и состояния запасов стерляди р. Обь.

Данные биологического анализа, позволяют судить о размерной и возрастной структуре стад стерляди. ОДУ обосновываются для научно-исследовательских целей и целей аквакультуры.

Река Обь в Сузунском районе. Согласно исследованиям в 2013–2016 гг. на данном участке Оби численность учтенного покатного стада стерляди в мае составляла 27,0–78,2 тыс. экз. (4,9–16,6 т). Нагульное стадо, по данным летних исследований, не превышало 19,7 тыс. экз., общая биомасса составляла 3,1 т. В уловах преобладали неполовозрелые особи (64,6 %). В 2020–2024 гг. численность нагульной стерляди составляла 5,7–7,7 тыс. экз., а биомасса 1,2–2,7 т соответственно. Уловы стерляди в период летнего нагула изменялись от 0,38 экз./плав (2020 г.) до 0,53 экз./плав (2022 г.).

В 2025 г. средний вылов стерляди за период наблюдений по открытой воде в апреле – октябре, в пересчете на стандартную сеть, длиной 25 м, и один стандартный плав, протяженностью 100 м, составил 0,47 экз. (1,9 экз./га). Учитывая площадь акватории Оби в Сузунском районе 3592,5 га (протяженность русла составляет 75 км, средняя ширина 479 м), ориентировочная численность стерляди составила 6,8 тыс. экз., биомасса (при средней массе 0,309 кг) – 2,1 т.

Проведенные в 2025 г. исследования стерляди р. Обь в границах Сузунского района позволяют использовать для прогнозирования запасов и ОДУ лишь эмпирические, трендовые и немодельные методы с учетом экспертной оценки запасов.

При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что основное значение сузунский участок представляет как путь весенней миграции к местам нагула в водохранилище и зимовальной в верховья Оби [Материалы, обосновывающие..., 2017].


Река Обь в нижнем бьефе НГЭС. До 2019 г. специализированные исследования стерляди ниже плотины НГЭС не проводились. В 2019 г. прилов стерляди при проведении научно-исследовательского лова составил 9 экз., что было недостаточно для определения ее численности и анализа биологических характеристик. В 2020 г. стерлядь в сетных контрольных орудиях лова, при учете запасов частичковых видов рыб, отсутствовала. В 2021–2024 гг. численность стерляди составляла 14,3–26,7 тыс. экз., а биомасса 4,3–8,5 т соответственно. Уловы стерляди в период летнего нагула изменялись от 0,38 экз./плав (2021 г.) до 0,70 экз./плав (2022 г.).

В 2025 г. средний вылов стерляди, в пересчете на стандартную сеть, длиной 25 м, и один стандартный плав, протяженностью 100 м, составил 0,65 экз. (2,60 экз./га). Учитывая площадь акватории Оби в нижнем бьефе НГЭС 10022,4 га (протяженность русла составляет 144 км, средняя ширина 696 м), ориентировочная численность стерляди составила 26,1 тыс. экз., биомасса (при средней массе 0,319 кг) – 8,3 т.

При прогнозировании численности стерляди и оценке состояния ее запасов в Новосибирской области необходимо учитывать ее принадлежность к среднеобскому стаду Томской области, которое находится в относительно благополучном состоянии и эксплуатируется промыслом. Часть этого стада поднимается для нагула на акваторию Новосибирской области, а в годы с высоким весенним паводком – и на нерест.

2.6 Обоснование рекомендуемого объема ОДУ

Оценка индексов биомассы и объем ОДУ стерляди на 2027 г. в р. Обь в Сузунском районе и в нижнем бьефе НГЭС, с использованием программы DLMtool представлены на рисунках 5, 6 и в таблице 16.



А

Б

Рисунок 5 – Диапазон оценок ОДУ применяемых процедур управления с использованием программы DLMtool к запасу стерляди р. Оби в Сузунском районе (А) и в нижнем бьефе НГЭС (Б)




Рисунок 6 – Оценка эффективности стратегий управления при определении величины ОДУ стерляди с использованием программы DLMtool р. Оби в Сузунском районе (А) и в нижнем бьефе НГЭС (Б)

На встроенной в пакет DLMTool операционной модели проводится анализ эффективности стратегий управления для схем, определивших величины ОДУ (см. рисунок 6). Результаты диагностики показывают количество применимых процедур управления с диапазоном оценок ОДУ (таблица 16).

Таблица 16 – Оценка эффективности стратегий управления при определении величины ОДУ стерляди р. Обь в границах Новосибирской области с использованием программы DLMtool

Метод	F<F MSY	Долгосрочная Y>0,5Y	B>BMSY	B>0,5BMSY	B>0,1BMSY	ОДУ, т
Сузунский район						
CC5	0,96	0,55	0,93	0,97	0,99	0,07
CC4	0,91	0,64	0,87	0,93	0,96	0,08
CC3	0,83	0,68	0,80	0,88	0,92	0,09
Islope1	0,61	0,52	0,60	0,69	0,78	0,09
Islope3	0,61	0,52	0,60	0,69	0,78	0,09
Islope2	0,61	0,52	0,60	0,69	0,78	0,09
Islope4	0,61	0,51	0,59	0,68	0,77	0,10
CurC	0,64	0,53	0,62	0,72	0,80	0,10
CC2	0,72	0,61	0,69	0,78	0,85	0,10
AvC_MLL	0,91	0,89	0,87	0,97	1,00	0,11
AvC	0,60	0,54	0,59	0,69	0,77	0,11
CC1	0,59	0,55	0,58	0,69	0,77	0,12
Среднее по методам						0,10
Нижний бьеф НГЭС						
CC5	0,96	0,55	0,93	0,97	0,99	0,09
CC4	0,91	0,64	0,87	0,93	0,96	0,10
CC3	0,83	0,68	0,80	0,88	0,92	0,12
Islope1	0,61	0,52	0,60	0,69	0,78	0,12

Islope2	0,61	0,52	0,60	0,69	0,78	0,13
CurC	0,64	0,53	0,62	0,72	0,80	0,13
CC2	0,72	0,61	0,69	0,78	0,85	0,13
Islope3	0,61	0,52	0,60	0,69	0,78	0,13
CC1	0,59	0,55	0,58	0,69	0,77	0,14
Islope4	0,61	0,51	0,59	0,68	0,77	0,14
AvC	0,60	0,54	0,59	0,69	0,77	0,15
AvC_MLL	0,91	0,89	0,87	0,97	1,00	0,15
Среднее по методам						0,13

Для прогноза ОДУ стерляди р. Обь в Сузунском районе могут быть применимы 12 процедур управления с диапазоном оценок от 0,07 до 0,12 т, где в среднем по методам показатель ОДУ на прогнозируемый год составляет 0,10 т. Для прогноза ОДУ стерляди р. Обь в нижнем бьефе НГЭС могут быть применимы 12 процедур управления с диапазоном оценок от 0,09 до 0,15 т, где в среднем по методам показатель ОДУ на прогнозируемый год составляет 0,13 т.

Для получения обоснованных выводов по динамике численности вида необходимо проведение полноценных многолетних исследований на 2-х участках р. Обь в границах Новосибирской области: выше Новосибирского водохранилища (участок Оби в границах Сузунского района) и участке Оби ниже плотины НГЭС (от плотины ГЭС до границ Томской области).

В границах Сузунского района наиболее перспективным местом для проведения исследований является район с. Малышево (53°44'20.88"С, 82°5'11.08"В), на участке ниже плотины НГЭС – приплотинный участок (54°51'30.40"С, 83°0'27.75"В), район п. Седова Заимка (55°22'16.14"С, 82°50'52.66"В), с. Камень (55°38'5.05"С, 83°39'49.55"В). В местах контрольных наблюдений в р. Обь глубины находятся в пределах 3–10 м, грунты представлены песками и песчано-галечниковыми россыпями. На данных местах возможен нерест стерляди и концентрируются реофильные кормовые организмы.

Отлов стерляди для проведения исследований в границах Сузунского района предполагается проводить плавными сетями, длиной до 150 м каждая, ячеей: 30 мм – 1 ед., 40 мм – 1 ед., 45 мм – 1 ед., 50 мм – 1 ед., ставными одностенными сетями, длиной не более 75 м, ячеей: 35 мм – 1 ед., 45 мм – 1 ед., 50 мм – 1 ед., а также фитилями – 15 ед., с ячеей в бочке 26 мм и в крыльях 40 мм. На участке Оби ниже плотины НГЭС предполагается использовать плавные сети, длиной до 150 м каждая, ячеей: 30 мм – 2 ед., 40 мм – 2 ед., 45 мм – 2 ед., 50 мм – 2 ед., ставными одностенными сетями, длиной не более 75 м, ячеей: 35 мм – 3 ед., 45 мм – 15 ед., 50 мм – 15 ед.

Ввиду растянутости размерно-возрастного состава изучаемой популяции стерляди (возраст от 1 до 16 лет, длина рыб от 15 до 67 см), для получения репрезентативных материалов объемы собранных материалов должны соответствовать принятым методикам [Правдин, 1966; Сечин, 2010]. Минимально допустимый объем научно-исследовательского лова соответствует величине минимально необходимого количества особей для статистически достоверной оценки показателей состояния запаса [Бабаян, 2000].

На проведение научно-исследовательского лова и полного биологического анализа для оценки настоящего состояния стада, структурных особенностей популяции, темпа роста стерляди в Верхней Оби, в границах Сузунского района следует отобрать не менее

320 экз. стерляди, что с учетом средней массы рыб 0,309 кг составит 0,1 т. Из этого количества для проведения полного биологического анализа используется 100–150 особей.

Аналогичным способом проводится определение объемов вылова стерляди в нижнем бьефе НГЭС. Вылов в научно-исследовательских целях составит 0,1 т стерляди.

Из определенных с помощью процедур управления программы DLMtool объемов ОДУ стерляди р. Обь на 2027 г. в Сузунском районе (0,100 т) и р. Обь в нижнем бьефе НГЭС (0,130 т) для научно-исследовательских целей необходимо выделить 0,2 т.

Из оставшихся объемов ОДУ в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС, в целях аквакультуры (искусственного воспроизводства), может быть выловлено 0,030 т. Отлов стерляди в целях аквакультуры рекомендуем проводить за пределами границ г. Новосибирска в Болотнинском районе.

Общий ОДУ стерляди р. Обь в границах Новосибирской области на 2027 г. составляет 0,230 т.

2.7 Анализ и диагностика полученных результатов

Прогноз ОДУ стерляди в научно-исследовательских целях в 2027 г. составляет 0,2 т. Вылов в научно-исследовательских целях будет осуществляться в р. Обь выше и ниже Новосибирского водохранилища. Вылов данной величины позволит оценить запасы стерляди, оценить размерно-возрастную структуру популяции и разработать рекомендации по необходимым объемам выпуска ее молоди в р. Обь в Сузунском районе и ниже плотины НГЭС.

Прогноз ОДУ стерляди в целях аквакультуры (искусственного воспроизводства) на 2027 г. составит 0,030 т. Эти объемы вылова позволят использовать часть стада стерляди для повышения генетического разнообразия существующего ремонтно-маточного стада ООО «Рыбхоз».

2.8 Оценка воздействия промысла на окружающую среду

Научный лов будет проводиться на 2-х участках КНП общей протяженностью 7 км, что составляет всего 2,8 % от основного русла р. Обь.

Вылов в научно-исследовательских целях 0,1 т стерляди в р. Обь (Сузунский р-н) не окажет влияния на состояние стада, т. к. данная величина составит лишь 3,7–5,3 % биомассы стерляди, учтенной в 2021–2025 гг. – 1,9 т (2024 г.) – 2,7 т (2022 г.).

Вылов стерляди в р. Обь в нижнем бьефе в объеме 0,1 т составит лишь 1,2–2,3 % биомассы стерляди, учтенной в 2021–2025 гг. – 4,3 т (2021 г.) – 8,5 т (2022 г.).

На биологический анализ будет взято 200–300 экз. (63–94 кг), а остальные особи (106–137 кг) после проведения массовых промеров, будут выпущены в р. Обь.

Вылов стерляди предполагается проводить с использованием ставных и плавных сетей, а также речных фитилей. Использование сетей и фитилей является традиционным в рыбном промысле на данном водном объекте и их применение разрешено Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна [Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 30.10.2020 г. № 646] (далее Правила рыболовства). Согласно исследованиям, данные орудия лова являются экологически

безопасными и практически не травмируют пойманную рыбу. Отрицательного влияния работы сетей на водные биоценозы не выявлено.

При проведении отлова стерляди прилов других видов рыб, в том числе и осетра (занесенного в Красную книгу России [Красная книга..., 2021]), будет незамедлительно выпускаться в естественную среду обитания.

Регулярные наблюдения в местах максимальной концентрации стерляди будут препятствовать незаконному промыслу этого ценного вида.

Таким образом, реализация рекомендуемых объемов общих допустимых уловов не повлечет за собой негативных последствий для экосистемы р. Обь.

3 Нельма (*Stenodus leucichthys*) р. Обь в Сузунском районе и в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС

Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн, Новосибирская область, код статистического промыслового района – 406, 489

Разработчики биологического обоснования: Зайцев В.Ф., Балацкий П.С., Дорогин М.А., Шенхоров Р.Э., Селезнева М.В. и другие.

Новосибирский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

3.1 Материал и методика

3.1.1 Анализ доступного информационного обеспечения

В верхнем бьефе промышленный лов нельмы никогда не проводился, данные по прилову отсутствуют, сбор материалов биологического анализа ограничен периодом 1964–1972 гг. Ниже плотины Новосибирской ГЭС промышленный лов нельмы не проводится с 1974 г. Нельма окончательно выпадает из промысловой статистики в конце 1980-х годов, в связи с резким падением численности зрелых особей, поднимающихся на нерест. В период 1974–2003 гг. в отдельные годы проводился отлов нельмы для целей рыбоводства. В контрольных уловах встречается единично и эпизодически, данные биологического анализа отсутствуют, так как на этом участке вид уже с 1998 г. внесен в Красную книгу Новосибирской области [Красная книга..., 2018].

В 2019–2020 гг. по распоряжению ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» были проведены исследования архивных материалов и анализ ихтиологических наблюдений за численностью, распределением и условиями обитания нельмы р. Обь в Новосибирской области. Исследования, проведенные в 2019–2020 гг., позволили подготовить материалы, обосновывающие объем ОДУ нельмы р. Обь в 2021 г. в научно-исследовательских целях. В результате чего, с 2021 г. были начаты научно-исследовательские работы по изучению состояния запасов нельмы р. Обь в Новосибирской области (таблица 17).

Таблица 17 – Объем собранного материала для оценки состояния запасов нельмы в р. Обь в нижнем бьефе НГЭС

Год	Объем выборки, экз.	Сетепостановки, шт.	Плавь, шт.	Массовые промеры, экз.	Определен возраст, экз.
2021	30	87	59	30	30
2022	36	36	20	36	36
2023	38	16	15	38	38
2024	39	30	22	39	39
2025	37	27	33	37	37

Для оценки запасов нельмы применяли метод прямого учета с использованием плавных сетей. Применение прямого учета позволяет определить численность и размерный состав стад рыб. На основании полученных материалов рассчитывается средневзвешенная величина плотности скоплений рыб (экз./га), согласно принятым методикам [Бабаян и др., 1984; Сечин, 2010].

В 2021–2025 гг. отлов нельмы для исследований проводился с мая по ноябрь с помощью плавных сетей ячеей 45–80 мм и длиной до 150 м. Длина тоней составляла 500–1300 м. Глубина тоней в Оби изменялась от 3 до 5 м. Вылов нельмы в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС в 2025 г. составил 37 экз. Масса выловленных рыб находилась в пределах 1,7–4,2 кг. Всего проведено 33 сетных плава, учтены уловы из 27 сетепостановок. В уловах ставных сетей в 2025 г. нельма отсутствовала.

На участке р. Обь в границах Сузунского района в уловах плавных и ставных сетей в 2025 г. нельма отсутствовала.

3.1.2 Обоснование выбора методов оценки запаса

Расчет численности вида проведен по результатам плавного сетного лова (учетная съемка) [Сечин, 2010]. Определялось количество выловленных рыб в пересчете на стандартную сеть, длиной 25 м, и один стандартный плав, протяженностью 100 м, с учетом площади облова речного русла. Таким путем определялась плотность концентрации нельмы в количественном (экз./га), а с учетом средней массы выловленных рыб – в весовом отношении (кг/га). Полученные данные экстраполировались на общую площадь речного русла, учитывая его протяженность и среднюю ширину.

Для определения величины ОДУ нельмы на 2027 г. применен программный комплекс методов расчета допустимого изъятия из запаса – DLMtool [Методические рекомендации..., 2018]. В пакет DLMtool включены методы, работающие в условиях дефицита входной информации (III уровень информационного обеспечения). Применяются эмпирические, трендовые, индикаторные и другие приближенные методы. На встроенной в пакет DLMtool тестовой операционной модели проводится анализ эффективности стратегий управления для схем, определивших величины ОДУ. Результаты диагностики показывают количество предложенных процедур управления с диапазоном оценок ОДУ. С помощью процедуры оценок avgMP определяется показатель ОДУ на прогнозируемый год. Входными данными для расчета ОДУ на 2027 г. послужили – улов на усилие, предыдущий объем ОДУ, естественная смертность рыб, линейный и возрастной состав рыб в уловах (таблица 18).

Таблица 18 – Первичные данные для расчета ОДУ нельмы р. Обь в границах Новосибирской области с использованием программного комплекса DLMtool

Год	Предыдущий ОДУ, т	Вылов, т	Улов на усилие, кг	Естественная смертность (М)	Длина при 50% зрелости, см	Длина при 95% зрелости, см	Длина при первом захвате, см	Длина при полном выборе, см
2021	0,10	0,081	0,06	0,26	53,2	57,3	48	57,3
2022	0,10	0,090	0,05					
2023	0,32	0,095	0,06					
2024	0,17	0,098	0,06					
2025	0,10	0,097	0,08					

Для определения мгновенного коэффициента естественной смертности (М) нельмы использована формула эмпирической зависимости между этой величиной и возрастом

массового полового созревания [Бабаян и др., 1984]:

$$M = \frac{1,521}{t_n^{0,720}} - 0,155$$

где M – мгновенный коэффициент естественной смертности;

t_n – возраст массового полового созревания (в р. Обь в нижнем бьефе ГЭС – 6 лет) [Журавлев, 2003; Попов, 2007].

3.2 Ретроспективный анализ состояния запасов и промысла

До создания Новосибирского водохранилища на речном участке Оби, в пределах Новосибирской области, включая район будущего затопления, обитало 22 вида рыб, их общий вылов составлял около 300 т.

На всей акватории верхней Оби в 1950-х годах добывалось до 4,5 т нельмы, из них до 2,0 т на территории Новосибирской области [Лузанская Д. И., Савина, 1956].

Река Обь в Сузунском районе. В первые два десятилетия после зарегулирования Оби нельма была повсеместно распространена на всем отрезке Оби выше водохранилища и в самом водохранилище, где ее уловы отражались промысловой статистикой до 1973 г. и достигали 0,2 т [Сецко, 1976].

Производители полупроходной нельмы послужили основой для формирования в верхнем бьефе Новосибирской ГЭС жилой популяции. Долгое время численность жилой нельмы оставалась очень низкой, и по мере выбывания полупроходных производителей и их потомства, отрезанных плотиной НГЭС, ее годовые уловы в Новосибирском водохранилище во второй половины 1970-х гг. сокращаются до 17 экз.

Среднегодовой учетный прилов этого вида в летне-осенний период в период 1980–2001 гг. в активные орудия лова (тралы) составлял всего 1–5 экз., причем залавливалась она не ежегодно [Визер, Задумина, 2010]. Такое положение с запасами этого ценного вида послужило причиной внесения нельмы в Красные книги Республики Алтай (1996), Алтайского края (1998) и Новосибирской области (1999, 2008).

Нельма Верхней Оби показала высокую степень экологической устойчивости и приспособляемости к неблагоприятным воздействиям (факторам) окружающей среды, и в 2000-х гг. в водохранилище наблюдался быстрый рост численности этого вида. Так уже осенью 2002 г. учетный прилов разновозрастной нельмы в активные орудия лова на мелководьях верхней зоны составил 18 экз. и в последующие годы продолжал увеличиваться. Максимальный прилов – 115 экз. отмечен в 2007 г.

Численность нельмы Новосибирского водохранилища в 2007 г. составила 2873 экз. летом и 6157 экз. осенью, что в десятки раз выше численности этого вида в 1980 – 1990 гг. (152–492 экз.) [Визер, Задумина, 2010]. На этом уровне численность нельмы сохранялась и в 2010-е годы, так в 2018 г. она составила 4,2 тыс. экз. В 2019 г. численность нельмы сократилась до 2 тыс. экз., что, вероятно, было обусловлено снижением ее ската с вышерасположенного участка р. Обь, в результате уменьшения проточности водохранилища почти на 30 % по сравнению с предыдущим годом.

На речном участке выше водохранилища нельма в контрольных уловах малочисленна, среднегодовой прилов составляет всего 1 экз. [Журавлев, 2003]. С 2017 г. во всем Верхнеобском бассейне был введен запрет на промышленный лов нельмы. В 2020–2025 гг. при проведении мониторинговых исследований нельма в сетных уловах отсутствовала.

Таким образом, установлено, что на акватории Сузунского района нельма относится к очень редким видам. Исходя из ее присутствия в уловах в водохранилище, нельма использует этот участок реки для нагульных и зимовальных миграций.

Изучение биологии речной нельмы ограничено периодом 1964–1972 гг., а в 1979–1993 гг. она исследовалась лишь в пределах Алтайского края. Исследованиями Конева Л.А. (1969, 1972) было установлено, что нельма на участке выше водохранилища, характеризуется более высоким темпом роста, более ранним половым созреванием и коротким жизненным циклом в связи со снижением уровня пространственной разобщенности мест нереста, нагула и зимовки по сравнению с полупроходной нельмой из Средней Оби. Предельный возраст жилой нельмы в уловах составляет 8 лет, и лишь единичные особи доживают до одиннадцатилетнего возраста [Журавлев, 2006]. Максимальные размеры и масса составляют, соответственно 90 см и 7200 г. В нерестовом стаде преобладают особи 4+...7+ лет, массой 1700–4300 г.

Воспроизводство осуществляется на территории Алтайского края, преимущественно в р. Чарыш. В р. Оби на территории Сузунского района нерестилища нельмы отсутствуют. Покатные личинки, принесенные течением из вышерасположенного участка реки в границах Алтайского края, здесь единично залавливались только в 2010 г.

В траловых и сетных уловах водохранилища в настоящее время встречаются рыбы в возрасте 1+...5+ лет, длиной 26–56 см и массой 260–3400 г. В водоеме преобладает молодь нельмы в возрасте от 3+ до 4+ лет, с размерами тела 39–44 см и массой 840–1350 г.

В 2000-х гг. у верхнеобской нельмы сохранился высокий темп роста, обусловленный удлинением периода нагула. В то же время у молоди, перешедшей на хищное питание, наблюдается снижение линейных и весовых приростов, связанное с пищевой конкуренцией с судаком и снижением численности молоди аборигенных мелкочастиковых рыб.

Несмотря на превращение Новосибирского водохранилища в «лещово-судачий» водоем, эти акклиматизанты в рационе нельмы до настоящего времени фактически отсутствуют. Спектр питания хищничающих рыб, как и в начальный период существования водохранилища, большей частью состоит из двух видов – плотвы и окуня. В 2007 г. в желудках нельмы отмечена только плотва. Заметно изменился характер питания лишь у молоди в возрасте 1+...2+ лет, которая после акклиматизации в водохранилище дальневосточных мизид перешла на питание этими ракообразными, тогда как ранее, среди потребляемых кормов преобладали организмы зообентоса. Результаты наблюдений за приловом ценных видов и их размерными характеристиками в 2019–2024 гг. показали их крайне низкую численность на Сузунском участке. Всего был выловлен 1 экз. молоди нельмы (30 см) в апреле 2019 г. В летние и осенние месяцы нельма в сетных уловах отсутствовала. В этот период она встречалась в Новосибирском водохранилище и была представлена особями в возрасте 3+...7+ лет, длиной тела 37–63 см и массой 612–3256 г.

Река Обь в нижнем бьефе НГЭС. Плотина НГЭС стала препятствием для миграции нельмы в верховья Оби и отрезала 60–70 % ее нерестилищ. В первые годы после перекрытия Оби (1957 г.) наблюдался массовый подход к плотине и скат нельмы через нее. Интенсивный подход производителей в возрасте 5+...18+ лет наблюдался на протяжении всех первых 20 лет после образования плотины [Сецко, 1976], но численность нельмы постепенно снижалась. В начале 1960-х гг. вылов за одно притонение в сентябре

достигал 200–300 экз. с преобладанием молоди, а за 30 минут плава (сеть 70 м) залавливалось до 34 производителей [Еньшина, 1997]. В начале 1970-х гг. вылов под плотиной резко снижается, так в течение осени 1970 г. заловлено в невод всего 516 нельм, с преобладанием молоди. В последующие два десятилетия после 1989 г. уловы под плотиной продолжали снижаться. Даже при специализированном промысле в сентябре-октябре залавливаются единичные производители [Еньшина, 1997].

В первой половине 2000-х гг. средний вылов преднерестовой нельмы под плотиной НГЭС за притонение закидного невода составлял 0,22 экз., а общий вылов не превышал 4–10 экз. Молодь прилавливалась ежегодно, но единично.

По результатам исследований в 2021–2025 гг., вылов нельмы на стандартную плавную сеть, длиной 25 м, за один стандартный плав, протяженностью 100 м, составлял 0,023–0,031 экз. (таблица 19).

Таблица 19 – Динамика вылова, численности и биомассы нельмы р. Обь в нижнем бьефе НГЭС

Год	Средний вылов, экз./плав	Численность, тыс. экз.	Биомасса, т	Вылов, т*	ОДУ, т
2021	0,023	0,868	2,4	0,081	0,100
2022	0,023	0,871	2,0	0,090	0,100
2023	0,024	0,974	2,6	0,095	0,100
2024	0,023	0,923	2,3	0,098	0,100
2025	0,031	1,223	3,2	0,097	0,100

Примечание: * – Вылов в научно-исследовательских целях

Предельный возраст полупроходной нельмы в уловах ниже плотины Новосибирской ГЭС составляет 19 лет. Нерестовое стадо, в годы с высокой численностью, было представлено особями 8+...17+ лет. В 2021–2024 гг. возраст вылавливаемых рыб составлял от 2+ до 10+ лет. Средний возраст рыб в 2021 г. составил 6,7 лет, в 2022–2024 гг. варьировался от 4,6 лет (2023 г.) до 5,4 лет (2022 г.).

Размеры нельмы в уловах в 2021–2024 гг. колебались от 32 до 75 см (таблица 20). В 2021 г. преобладающее значение имели особи с длиной 56–60 см, доля которых составляла 40,0 %, средняя длина составила 55,1 см, средняя масса – 2713,3 г. В 2022 г. и 2023 г. основу стада (52,8 и 42,1% соответственно) составляли особи длиной 42–52 см, а в 2024 г. – 46–60 см (76,9 %). Средняя длина и масса особей в 2022 г. составила 51,4 см и 2305,6 г., в 2023 г. – 53,6 см и 2660,5 г., в 2024 г. – 55,8 см и 2525,5 г.

Таблица 20 – Показатели роста нельмы р. Обь в нижнем бьефе НГЭС

Возраст	Длина, см				Масса, г			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
2+	–	–	<u>33,0</u> 32–34	–	–	–	<u>550,0</u> 500–600	
3+	–	<u>43,0</u> 42–44	<u>44,0</u> 43–45	–	–	<u>1300,0</u> 1100–1500	<u>1600,0</u> 1400–1800	
4+	–	<u>44,9</u> 44–46	<u>48,9</u> 45–52	<u>50,0</u> 47–53	–	<u>1500,0</u> 1400–1600	<u>1787,5</u> 1300–2300	<u>1862,1</u> 1645–2100
5+	<u>48,0*</u> 47–50	<u>48,5</u> 46–52	<u>57,4</u> 53–60	<u>55,4</u> 51–59	<u>1666,7</u> 1400–1900	<u>1862,5</u> 1700–2300	<u>2820,0</u> 2100–3200	<u>2287,5</u> 1860–2930
6+	<u>51,8</u> 49–56	<u>55,5</u> 54–52	<u>63,0</u> 60–65	<u>61,9</u> 60–65	<u>2254,5</u> 1700–2700	<u>2483,3</u> 2200–3500	<u>3966,7</u> 3300–5500	<u>3278,6</u> 2905–3700
7+	<u>56,7</u> 55–60	<u>57,8</u> 50–60	<u>69,8</u> 67–75	<u>66,8</u> 65–69	<u>2880,0</u> 2500–3200	<u>3116,7</u> 2700–3600	<u>5420,0</u> 4800–7000	<u>4362,5</u> 4140–4725
8+	<u>59,8</u> 56–62	<u>60,0</u> –	–	–	<u>3250,0</u> 2900–3500	<u>3750,0</u> 3700–3800	–	–
9+	<u>64,0</u> –	<u>65,0</u> –	–	–	<u>4500,0</u> –	<u>4000,0</u> –	–	–
10+	<u>70,0</u> –	<u>70,0</u> –	–	–	<u>5300,0</u> –	<u>6000,0</u> –	–	–

Примечание: – * В числителе – среднее, в знаменателе – колебания

По результатам исследований 2025 г., в уловах присутствовала нельма в возрасте 5+...8+ лет, длиной 48–68 см. Преобладающее значение имели особи с длиной 51–60 см, доля которых составляла 67,6 %. Средние показатели длины и массы составили 57,6 см и 2615,0 г. Средний возраст рыб составил 6,0 лет. Темп роста нельмы в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС представлен в таблице 21.

Таблица 21 – Размерно-возрастная характеристика нельмы р. Обь в нижнем бьефе НГЭС в 2025 г.

Возраст	Длина, см		Масса, г		Количество	
	средняя	колебания	средняя	колебания	экз.	%
5+	53,2±0,58	48–57	2112,1±73,34	1750–2650	14	37,9
6+	57,3±0,38	56–60	2540,0±81,38	2200–3050	12	32,4
7+	62,6±0,53	61–65	3195,0±142,12	2700–3950	9	24,3
8+	67,0±1,00	66–68	3975,0±225,00	3750–4200	2	5,4
Итог	57,6±0,76	48–68	2615,0±101,58	1750–4200	37	100,0

Естественное воспроизводство полупроходной нельмы достоверно отмечалось до 2010-х годов, что подтверждается отловом ее покатных личинок в р. Обь в 2007 и 2009 гг. [Визер, Горцева, 2012; Визер и др., 2017].

Искусственное воспроизводство нельмы. На территории Новосибирской области функционируют три предприятия, располагающие рыбоводными мощностями, ориентированными на инкубацию икры и подращивание молоди рыб, в том числе для целей искусственного воспроизводства сиговых видов рыб (нельма, муксун, пелядь): ООО «Рыбхоз», инкубационный цех ООО «Новосибирский рыбозавод» и экспериментальный рыбоводный пункт Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

ООО «Рыбхоз» имеет собственное ремонтно-маточное стадо нельмы. В р. Обь на территории Новосибирской области ООО «Рыбхоз» в 2021 г. было выпущено 144900 экз., в 2022 г. – 200562, в 2023 г. – 1242601, в 2024 г. – 593645, в 2025 г. – 485844 экз. молоди (сеголетков) нельмы, массой не менее 1,0 г, полученной от производителей собственного ремонтно-маточного стада, а также производителей нельмы, отловленных в р. Обь в Томской области. Выпуск молоди нельмы осуществлялся в р. Обь в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС, на участке (55°21'32.4" с.ш. 82°47'02.6" в.д.) за чертой г. Новосибирска, что будет способствовать увеличению численности нельмы на данном участке р. Оби. Исходя из промыслового возврата 0,155 от выпуска молоди массой 1,0 г. [Методика исчисления..., 2020], увеличение численности стада нельмы ожидается в количестве 22,5–192,6 тыс. экз.

В 2026 и 2027 гг. ООО «Рыбхоз» планируется отлов особей нельмы в р. Оби в нижнем бьефе НГЭС для улучшения генетического разнообразия ремонтно-маточного стада.

3.3 Определение биологических ориентиров

Обоснование ОДУ нельмы производится на основе предосторожного подхода [Бабаян, 2000; Шибяев, 2014], который трактуется как концепция промыслового использования водных биоресурсов, обеспечивающая биологическую безопасность эксплуатируемых запасов. ОДУ рассматривается как некоторый управляющий параметр, а не биологическое средство, отражающее продуктивность эксплуатируемой популяции. Применяются целевые, граничные и буферные ориентиры.

Граничный ориентир по биомассе показывает предел состояния системы запас – промысел, который не должен быть перейден. Для данного ориентира нами принимается биомасса наименьшего промыслового запаса нельмы в нижнем бьефе НГЭС – 2,0 т (см. таблицу 19).

Буферный ориентир по уловам является индикатором для принятия превентивных мер по управлению системой, чтобы не допустить ее приближения к граничному ориентиру. В качестве буферного ориентира принимается средняя биомасса запаса (за 2021 – 2025 гг.) – 2,5 т.

Целевой ориентир управления устанавливает цель, к которой должен стремиться рациональный промысел. Такой целью нами принимается величина ОДУ нельмы в научно-исследовательских целях.

3.4 Правила регулирования промысла

Текущая биомасса запаса нельмы для Верхней Оби в нижнем бьефе НГЭС – 3,2 т.

Идентификация зонального ПРП осуществляется с помощью двух пар биологических ориентиров: граничных и целевых по биомассе нерестового или промыслового запаса и промысловой смертности, скорректированных с учетом доверительных интервалов этих оценок. Оценка индексов биомассы (B , $BMSY$) и промысловой смертности (F , $FMSY$) нельмы на 2027 г. с использованием программы DLMtool представлена в таблице 22. Согласно расчетным данным в 2027 г. показатель биомассы (B) стада нельмы больше биомассы максимально устойчивого улова ($BMSY$),

показатель промысловой смертности (F) меньше промысловой смертности максимально устойчивого улова ($FMSY$), что предполагает безопасное использование части запаса.

Исходя из этого, определяются следующие границы допустимой (биологически безопасной) области управления данного запаса: изымаемая биомасса не должна приводить к сокращению запаса. ОДУ определяется в научно-исследовательских целях и целях аквакультуры (искусственного воспроизводства).

3.5 Прогнозирование состояния запаса

В 2025 г. проводился научно-исследовательский лов на участке Оби в нижнем бьефе НГЭС, в ходе которого были собраны данные о вылове нельмы в контрольные орудия лова в количестве 37 экз. Эти данные использовались для оценки численности и состояния запасов нельмы р. Обь.

Данные биологического анализа, позволяют судить о размерной и возрастной структуре стада нельмы. ОДУ обосновываются лишь для научного лова.

Верхняя Обь в Сузунском районе

На акватории Сузунского района нельма относится к очень редким видам и использует этот участок реки для нагульных и зимовальных миграций в водохранилище в маловодные годы и в периоды подъема численности.

В 2020–2025 гг. при проведении мониторинговых исследований, нельма в сетных уловах отсутствовала. ОДУ нельмы для данного участка Оби не разрабатывается.

Верхняя Обь в нижнем бьефе НГЭС

По результатам исследований 2025 г. вылов нельмы в пересчете на стандартную плавную сеть, длиной 25 м, за один стандартный плав, протяженностью 100 м, составил 0,031 экз. (0,124 экз./га). Учитывая перекрытие около 3,6 % средней ширины русла (696 м) сетью длиной 25 м, на 1 км русла вылавливалось 8,5 экз. нельмы. Учитывая протяженность русла Оби в нижнем бьефе НГЭС (144 км), ориентировочная численность нельмы составила 1,224 тыс. экз., биомасса (при средней массе 2,615 кг) – 3,2 т.

Для более обоснованного прогнозирования состояния запасов нельмы необходим длительный ряд специализированных наблюдений за изменением биологических характеристик, численности и биомассы запаса, позволяющий учесть межгодовые колебания параметров стада и факторы их определяющие.

3.6 Обоснование рекомендуемого объема ОДУ

Оценка индексов биомассы и объем ОДУ нельмы на 2027 г. с использованием программы DLMtool представлены на рисунках 7, 8 и в таблице 22.




Рисунок 7 – Диапазон оценок ОДУ применяемых процедур управления с использованием программы DLMtool к запасу нельмы р. Оби в нижнем бьефе НГЭС




Рисунок 8 – Оценка эффективности стратегий управления при определении величины ОДУ нельмы р. Оби в нижнем бьефе НГЭС с использованием программы DLMtool

Был проведен анализ эффективности стратегий управления для схем, определивших величины ОДУ нельмы, на встроенной в пакет DLMtool операционной модели (рисунки 7, 8). Результаты диагностики показывают количество применимых процедур управления с диапазоном оценок ОДУ (таблица 22).

Для прогноза ОДУ нельмы р. Обь в нижнем бьефе НГЭС могут быть применимы 12 процедур управления с диапазоном оценок от 0,13 до 0,24 т, где в среднем по методам показатель ОДУ на прогнозируемый год составляет 0,21 т.

Таблица 22 – Оценка эффективности стратегий управления при определении величины ОДУ нельмы р. Оби в нижнем бьефе НГЭС с использованием программного комплекса DLMtool

Метод	F<FMSY	Долгосрочная Y>0,5Y	B>BMSY	B>0,5BMSY	B>0,1BMSY	ОДУ, т
CC5	0,96	0,55	0,93	0,97	0,99	0,13
CC4	0,91	0,64	0,87	0,93	0,96	0,16
CC3	0,83	0,68	0,80	0,88	0,92	0,18
CC2	0,72	0,61	0,69	0,78	0,85	0,20
AvC_MLL	0,91	0,89	0,87	0,97	1,00	0,21
AvC	0,60	0,54	0,59	0,69	0,77	0,22
CC1	0,59	0,55	0,58	0,69	0,77	0,22
Islope1	0,61	0,52	0,60	0,69	0,78	0,22
Islope2	0,61	0,52	0,60	0,69	0,78	0,23
Islope3	0,61	0,52	0,60	0,69	0,78	0,23
CurC	0,64	0,53	0,62	0,72	0,80	0,23
Islope4	0,61	0,51	0,59	0,68	0,77	0,24
Среднее по методам						0,21

Для получения обоснованных выводов по динамике численности вида необходимо проведение полноценных исследований в границах Новосибирской области на участке Оби ниже плотины НГЭС в период с 1 апреля по 31 декабря.

Наиболее перспективными местами для проведения исследований является приплотинный участок (54°51'30.40"С, 83°00'27.75"В), район п. Седова Заимка (55°22'16.14"С, 82°50'52.66"В), с. Камень (55°38'5.05"С, 83°39'49.55"В).

Отлов нельмы для проведения исследований предполагается проводить плавными сетями, длиной до 150 м каждая, ячеей: 30 мм – 2 ед., 40 мм – 2 ед., 45 мм – 2 ед., 50 мм – 2 ед., 60 мм – 2 ед., 70 мм – 2 ед., 80 мм – 2 ед., ставными одностенными сетями, длиной не более 75 м, ячеей: 35 мм – 3 ед., 45 мм – 15 ед., 50 мм – 15 ед., 55 мм – 15 ед., 60 мм – 15 ед., 70 мм – 15 ед., 90 мм – 7 ед.

Для оценки численности и анализа структурных особенностей популяции этого вида, на участке Оби нижнего бьефа в Новосибирской области при проведении научно-исследовательского лова в 2027 г. следует отобрать 38 экз. нельмы, что с учетом средней массы рыб (2,6 кг) составит 0,1 т.

Из определенных с помощью процедур управления программы DLMtool объемов ОДУ нельмы р. Обь на 2027 г. в нижнем бьефе НГЭС (0,210 т) для научно-исследовательских целей необходимо выделить 0,1 т.

Из оставшихся объемов ОДУ в целях аквакультуры (искусственного воспроизводства) может быть выловлено 0,110 т. Отлов нельмы в целях искусственного воспроизводства рекомендуем проводить за пределами границ г. Новосибирска в Болотнинском районе.

Общий ОДУ нельмы р. Обь в границах Новосибирской области на 2027 г. составляет 0,210 т.

3.7 Анализ и диагностика полученных результатов

Прогноз ОДУ нельмы на 2027 г. состоит из обоснования объемов для научно-исследовательского лова и вылова в целях аквакультуры. ОДУ в научно-исследовательских целях на 2027 г. составляет 0,1 т. Вылов данной величины позволит оценить размерно-возрастную структуру популяции, определить ее численность и дальнейшие перспективы использования нельмы для целей искусственного воспроизводства. Результаты исследований численности нельмы будут использованы для оценки состояния ее запасов.

Прогноз ОДУ нельмы в целях аквакультуры (искусственного воспроизводства) на 2027 г. составит 0,110 т. Эти объемы вылова позволят использовать часть стада нельмы для повышения генетического разнообразия существующего ремонтно-маточного стада ООО «Рыбхоз».

3.8 Оценка воздействия промысла на окружающую среду

Научный лов будет проводиться в р. Обь в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС. ОДУ в объеме 0,1 т составляет не более 38 экз. и не окажет существенного влияния на численность популяции нельмы.

Вылов нельмы предполагается проводить с использованием ставных и плавных сетей в русле р. Оби. Использование этих орудий лова является традиционным в рыбном промысле на данном водном объекте и их применение разрешено Правилами рыболовства. Согласно исследованиям, данные орудия лова являются экологически безопасными. Отрицательного влияния работы сетей на водные биоценозы не выявлено. При проведении отлова нельмы прилов других видов рыб, в том числе и осетра (занесенного в Красную книгу России [Красная книга..., 2021]), будет незамедлительно выпускаться в естественную среду обитания.

Наблюдения позволят установить места повышенной концентрации нельмы и разработать мероприятия по их охране, что приведет к снижению незаконного промысла этого ценного вида.

Таким образом, реализация рекомендуемых объемов общих допустимых уловов не повлечет за собой негативных последствий для окружающей среды, численности нельмы и биологического разнообразия экосистемы р. Обь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Промысловая добыча стерляди и нельмы в р. Обь Новосибирской области не ведется с середины прошлого века. Как прилов при промысле других видов стерлядь и нельма встречались до 1980-х годов. В 1999 г. с учреждением Красной книги Новосибирской области промысел этих видов полностью запрещен. Однако, до настоящего времени стерлядь и нельма служат объектом браконьерского и неорганизованного любительского лова.

Оценка численности и биологических характеристик стерляди р. Оби проводилась в 2012–2016 гг. выше Новосибирского водохранилища в границах Сузунского района, с 2021 г. научно-исследовательские работы по изучению состояния запасов стерляди и нельмы стали проводиться в р. Оби в верхнем и нижнем бьефах Новосибирского водохранилища.

По данным наблюдений 2025 г. на участке Оби в Сузунском районе, численность стерляди составила 6,8 тыс. экз. (2,1 т). Ниже плотины НГЭС стерлядь принадлежит к среднеобскому стаду Томской области, которое эксплуатируется промыслом. Численность рыб, поднимающихся в Новосибирскую область для нереста и нагула, зависит от гидрологического режима. В 2025 г. численность стерляди составила 26,1 тыс. экз. (8,3 т).

ОДУ стерляди на 2027 г. для научно-исследовательского лова определен в объеме 0,2 т, что позволит собрать материалы по биологической характеристике вида, определить его численность и воспроизводительный потенциал. ОДУ стерляди в целях аквакультуры определен в объеме 0,030 т для обновления ремонтно-маточных стад рыбоводных организаций.

По результатам проведенных исследований, численность нельмы р. Оби в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС в границах Новосибирской области в 2025 г. составила 1,224 тыс. экз. (3,2 т). ОДУ нельмы на 2027 г. для научно-исследовательского лова определен в объеме 0,1 т, что позволит собрать материалы по биологической характеристике вида, определить его численность и воспроизводительный потенциал. ОДУ нельмы в целях аквакультуры определен в объеме 0,110 т для обновления ремонтно-маточных стад рыбоводных организаций.

Общая величина объема ОДУ рыб в р. Обь Новосибирской области на 2027 г. составляет 0,440 т: 0,210 т – нельмы, 0,230 т – стерляди (таблица 23). Предлагаемый объем ОДУ нельмы и стерляди позволит определить численность и биологические характеристики этих видов для оценки состояния их запасов.

Таблица 23 – Прогноз ОДУ водных биоресурсов в р. Обь в границах Новосибирской области на 2027 г., т

Вид ВБР	В научно-исследовательских целях	В целях аквакультуры	Всего
Стерлядь	0,200	0,030	0,230
Нельма	0,100	0,110	0,210

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Бабаян В. К. Предосторожный подход к оценке общего допустимого улова (ОДУ). Анализ и рекомендации по применению. – Москва: Изд. ВНИРО, 2000. – 188 с.
- 2 Бабаян В.К., Булгакова Т.И., Бородин Р.Г., Ефимов Ю.Н. Методические рекомендации. Применение методов и моделей для оценки запасов рыб. – Москва: ОНТИ ВНИРО, 1984. – 154 с.
- 3 Визер А. М., Дорогин М. А., Цапенков А. В. Видовой состав и распределение молоди в реке Оби ниже плотины Новосибирской ГЭС // Вестник рыбохозяйственной науки. – Тюмень, 2017. – Т. 4. – №4 (16). – С. 39–46.
- 4 Визер А. М., Горцева Д. Б. Влияние гидрологического режима на распространение и миграции молоди рыб Верхней Оби // Материалы международной научно-практической конференции с международным участием. – Омск, 2012. – С. 100–103.
- 5 Визер А. М., Задумина Э. Ю. Современное состояние запасов и биология нельмы Новосибирского водохранилища // VII Международное научно-производственное совещание по биологии, биотехнике сиговых рыб. – Тюмень, 2010. – С. 163–166.
- 6 Вотинов Н. П., Петкевич А. Н., Сецко Р. И. Опыт искусственного разведения осетровых рыб в Обь-Иртышском бассейне. – Новосибирск, 1957. – 14 с.
- 7 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Новосибирской области в 2024 году» // Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. – Новосибирск, 2025. – 208 с.
- 8 Дорогин М. А., Визер А. М., Селезнева М. В., Шиповалов Л. А. Современная численность стерляди (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758) Верхней Оби // Рыбоводство и рыбное хозяйство, 2014 г. – № 12. – С. 8–12.
- 9 Дорогин М. А., Визер А. М. Биология и экология стерляди (*Acipenser ruthenus Marsiglii* Brandt, 1883) Верхней Оби // Вестник рыбохозяйственной науки. – Тюмень, 2015. – Т. 2. – №1 (5). – С. 32–38.
- 10 Енышина С. А. Перспективы промысла рыбы в приплотинной зоне р. Оби // Биологическая продуктивность водоемов Западной Сибири и их рациональное использование. – Новосибирск, 1997. – С. 92–94.
- 11 Журавлев В. Б. Рыбы бассейна Верхней Оби // Экология рыб Обь-Иртышского бассейна. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. – С. 201–204.
- 12 Журавлев В. Б. Рыбы бассейна Верхней Оби. – Барнаул: Изд-во Алтайск. ун-та, 2003. – 292 с.
- 13 Интересова Е. А. К вопросу о возможности заготовки диких производителей стерляди (*Acipenser ruthenus* L.) в бассейне Верхней и Средней Оби (в пределах Томской области) // Международная научно-практическая конференция «Аквакультура осетровых рыб: проблемы и перспективы», г. Астрахань 10–12 октября 2017 г., г. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2017. – С. 92–94.
- 14 Конева Л. А. К биологии нельмы верхнего бьефа Новосибирской ГЭС // Рыбное хозяйство водоемов южной зоны Западной Сибири. – Новосибирск, 1969. – С. 30–38.
- 15 Конева Л. А. Нельма верхнего бьефа плотины Новосибирской ГЭС: Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Том. Гос. Ун-т им. В. В. Куйбышева. – Томск, 1972. – 21 с.

- 16 Красная книга Новосибирской области: Животные, растения и грибы/ Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. – 3-е изд. перераб. и доп. – Новосибирск: Типография Андрея Христолюбова, 2018. – 588 с.
- 17 Красная книга Российской Федерации, том «Животные». 2-ое издание. – М.: ФГБУ «ВНИИ Экология». – 2021. – 1128 с.
- 18 Лузанская Д. И., Савина Н. О. Рыбохозяйственный водный фонд и уловы рыбы во внутренних водоемах СССР. – Москва, 1956. – 214 с.
- 19 Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах Новосибирской области на 2018 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду) / Отчет ЗапСибНИИВБАК. – Тюмень, 2017. – 43с.
- 20 Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах Зоопланктон и его продукция / Гос. НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, АН СССР, Зоол. ин-т; [Сост. А. А. Салазкин и др.]. — Ленинград: ГосНИОРХ, 1984. — 33 с.
- 21 Методическое пособие по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция / Гос. НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, АН СССР, Зоол. ин-т. – Ленинград: ГосНИОРХ, 1982. – 33 с.
- 22 Методические рекомендации по оценке запасов приоритетных видов водных биологических ресурсов / В. К. Бабаян, А. Е. Бобырев, Т. И. Булгакова [и др.]. – Москва: ВНИРО, 2018. – 312 с.
- 23 Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. Приказ Минсельхоза России № 167 от 31 марта 2020 г. (зарегистрирован Министерством юстиции России 15 сентября 2020 г., регистрационный №59893). – 2020 г.
- 24 Митрофанова Е. Ю. Оценка состояния и качества воды реки Оби по показателям фитопланктона // Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии. – Барнаул, 2012. – Т.2. – С. 162–166.
- 25 Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 1. Зоопланктон / Под ред. В. Р. Алексеева, С. Я. Цалолихина. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 495 с.
- 26 Панкратова В. Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Chironominae фауны СССР (Diptera, Chironomidae=Tendipedidae) // Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР. – Ленинград: Наука, 1983. – Вып. 134. – 296 с.
- 27 Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. – Москва: Пищевая пром-сть, 1966. – 376 с.
- 28 Попов П. А. Рыбы Сибири. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2007. – 526 с.
- 29 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 г. № 206 (с изменениями на 10 июня 2021 года) «Об утверждении Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения».
- 30 Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 646 «Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2021 №

62767) [Электронный ресурс]. URL: <https://doopt.ru/files/pr646-2020.10.30.pdf> (дата обращения: 22.01.2026).

31 Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08 сентября 2021 г. № 618 (в ред. от 10.07.2024) «Об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов водных биологических ресурсов», зарегистрированный Минюстом России 15.10.2021 г. (регистрационный № 65432) [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/608935029> (дата обращения: 13.02.2026).

32 Приказ Федерального агентства по рыболовству от 06 февраля 2015 г. № 104 (в ред. Приказа Росрыболовства от 04.04.2016 № 237) «О представлении материалов, обосновывающих общие допустимые уловы водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Российской Федерации, а также в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, а также внесения в них изменений» [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/557526160> (дата обращения: 13.02.2026).

33 Савкин В.М., Двуреченская С.Я. Особенности гидролого-гидрохимического режима Новосибирского водохранилища при его многолетней эксплуатации // Актуальные проблемы водохранилищ. — Ярославль, 2002. С. 266–267.

34 Сецко Р. И. Рыбное хозяйство Новосибирского водохранилища // Биологический режим и рыбохозяйственное использование Новосибирского водохранилища. — Новосибирск, 1976. — С. 153–165.

35 Сечин Ю. Т. Биологические исследования на внутренних водоемах. — Калуга: Издательство научной литературы «ЭЙДОС», 2010. — 204 с.

36 Соловов В. П. Современное состояние сибирского осетра верхнего течения Оби // Вопр. Ихтиологии, 1997. — Т. 37. — Вып. 1. — С. 47–53.

37 Соловов В. П. Стерлядь как перспективный объект лицензионного лова в верховьях Оби // Биологическая продуктивность водоемов Западной Сибири и их рациональное использование. — Новосибирск, 1998. — С. 142–144.

38 Шибаев С. В. Промысловая ихтиология. — Калининград: ООО «Аксиос», 2014. — 535 с.